

## イマチニブ錠100mg「EE」

## 【この薬は？】

販売名	イマチニブ錠 100mg「EE」 Imatinib tab.100mg「EE」
一般名	イマチニブメシル酸塩 Imatinib Mesilate
含有量 (1錠中)	119.5mg (イマチニブとして 100mg)

## 患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」

<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

## 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗悪性腫瘍剤の中のチロシンキナーゼ阻害剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、異常なたんぱく質（Bcr-Abl）の働きを選択的に阻害することにより、がん細胞の増殖を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。
  1. 慢性骨髄性白血病
  2. フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 患者や家族の方は、この治療の必要性や注意すべき点などについて十分理解できるまで説明を受けてください。説明に同意した場合に使用が開始されます。
- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にイマチニブ製剤に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
  - ・妊婦または妊娠している可能性がある人(この薬を使用したお母さんが流産したとの報告や奇形を有する子供を出産したとの報告があります。)
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・肝臓に障害がある人
  - ・高齢の人
  - ・心臓に障害のある人または過去に心臓に障害があった人
- この薬には併用を注意すべき薬や飲食物があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- この薬の使用前に肝機能検査、血液検査が行われます。
- この薬の使用前に肝炎ウイルスの感染の有無が確認され、適切な処置が行われます。

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

また、この薬を飲んでいる間は、肝機能検査、血液検査の結果により飲む量が調節されます。

#### 〔慢性骨髄性白血病の場合〕

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

	慢性期		移行期・急性期	
	通常量	最高量	通常量	最高量
1回量	4錠	6錠	6錠	4錠
飲む回数	1日1回食後		1日1回食後	1日2回食後

#### 〔フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病〕

通常、成人の飲む量および回数は、1日1回食後、1回6錠です。

### ●どのように飲むか？

多め(200mL程度)の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れた分は飲まずにとぼして、次の決められた時間に1回分を飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

吐き気、嘔吐（おうと）、腹痛、下痢、食欲減退、発疹（ほっしん）、むくみ、筋肉痛などの症状があらわれることがあります。これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡をしてください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・体液貯留（浮腫、胸水、腹水など）があらわれることがあるので、定期的に体重測定が行われることがあります。急激な体重の増加、呼吸困難などがあらわれたら、ただちに受診してください。
- ・重篤な肝機能障害があらわれることがあるので、副作用の早期発見のため、飲み始める前と飲み始めてからは1カ月に1回（あるいは状態に応じて）、肝機能検査が行われます。
- ・B型肝炎ウイルスにかかっている人、または過去にかかったことがある人（HBs抗原陰性、かつHBc抗体またはHBs抗体陽性）がこの薬を使用した場合に、B型肝炎ウイルスの再活性化があらわれることがあります。この薬の使用開始後は、継続して肝機能検査や肝炎ウイルス感染の検査が行われます。
- ・白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血があらわれることがあるので、飲み始める前と飲み始めの1カ月間は毎週1回、2カ月目は2週間に1回、その後は2～3カ月に1回、血液検査が行われます。
- ・めまい、眠気、目がかすれるなどの症状があらわれることがありますので、高いところでの作業、自動車の運転など危険を伴う機械を操作するときには注意してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人はこの薬を使用できません。妊娠する可能性のある人は、この薬を使用している間は避妊してください。（この薬を使用したお母さんが流産したとの報告や奇形を有する子供を出産したとの報告があります。また動物実験で、受精卵が着床した後の死亡、胎児の低体重、脳、頭の骨の異常が認められています。）
- ・妊娠する可能性のある人は、避妊の必要性について説明を受け、この薬を使用している間は指示どおりに避妊してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・グレープフルーツジュースによって、この薬の作用が強くあらわれることがありますので飲食は避けてください。
- ・セイヨウオトギリソウ（St. John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）を含有する食品は、この薬に影響しますので控えてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

## 副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。


重大な副作用	主な自覚症状
骨髄抑制（汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血） こつずいよくせい（はんけつきゅうげんしょう、はつけつきゅうげんしょう、こうちゅうきゅうげんしょう、けっしょうばんげんしょう、ひんけつ）	出血しやすい、出血が止まりにくい、歯ぐきの出血、鼻血、あおあざができる、発熱、喉の痛み、体がだるい、めまい
出血（脳出血、硬膜下出血） しゅつけつ（のうしゅつけつ、こうまくかしゅつけつ）	意識の低下、考えがまとまらない、頭痛、しゃべりにくい、吐き気、嘔吐（おうと）、手足のまひ・しびれ、半身不随、片側のまひ、意識を失って深く眠りこむ、判断力の低下、むかむかする、めまい、もどす
消化管出血 しょうかかんゆつけつ	吐き気、嘔吐（おうと）、腹痛、血が混ざった便、黒色便、血を吐く、貧血
胃前庭部毛細血管拡張症 いぜんていぶもうさいけつかんかくちょうしょう	食欲不振、むかむかする、お腹がはる、血が混ざった便、黒色便、血を吐く、貧血
消化管穿孔 しょうかかんせんこう	吐き気、嘔吐（おうと）、激しい腹痛
腫瘍出血 しゅようしゅつけつ	吐き気、嘔吐（おうと）、お腹がはる、貧血、血が混ざった便
肝機能障害 かんきのうしょうがい	皮膚や白目が黄色くなる、体がだるい、食欲不振、吐き気、嘔吐（おうと）、かゆみ
黄疸 おうだん	皮膚や白目が黄色くなる、尿の色が濃くなる
肝不全 かんふぜん	食欲不振、吐き気、嘔吐（おうと）、羽ばたくような手のふるえ
重篤な体液貯留（胸水、肺水腫、腹水、心膜滲出液、心タンポナーデ、うっ血性心不全） じゅうとくなたいえきちよりゅう（きょうすい、はいすいしゅ、ふくすい、しんまくしんしゅつえき、しんタンポナーデ、うっけつせいしんふぜん）	息苦しい、息切れ、から咳、胸の痛み、お腹がはる、横になるより座っている時に呼吸が楽になる、食欲低下、体がだるい、全身のむくみ
感染症（肺炎、敗血症） かんせんしょう（はいえん、はいけつしょう）	かぜのような症状、発熱、さむけ、咳、息切れ、痰がでる、関節の痛み、筋肉の痛み

重大な副作用	主な自覚症状
重篤な腎障害 じゅうとくなじんしょうがい	尿量が減る、顔や手足のむくみ、口の渇き、食欲不振
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	発熱、息苦しい、から咳
肺線維症 はいせんいしょう	発熱、息苦しい、息切れ、から咳
重篤な皮膚症状(中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis: TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、多形紅斑、剥脱性皮膚炎) じゅうとくなひふしょうがい (ちゅうどくせいひょうひえしゆうかいしょう (トキシックエピダーマルネクロリシス: テン)、ひふねんまくがんしょうこうぐん (スティーブンス・ジョンソンしょうこうぐん)、たけいこうはん、はくだつせいひふえん)	発熱、高熱、ひどい口内炎、唇や口内のただれ、結膜のただれ、陰部の痛み、まぶたや眼の充血、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ (水疱)、中央にむくみをともなった赤い斑点、赤い発疹 (ほっしん)、全身の発赤、皮膚がはがれおちる、関節の痛み、体がだるい、食欲不振、発疹 (ほっしん) やみずぶくれができる、かさぶた
ショック ショック	めまい、頭痛、立ちくらみ
アナフィラキシー アナフィラキシー	しゃがれ声、眼と口唇のまわりのはれ、じんましん、動悸 (どうき)、息苦しい、体がだるい、考えがまとまらない、ほてり、意識の低下、ふらつき、息切れ、判断力の低下
心膜炎 しんまくえん	発熱、息切れ、息苦しい、胸の痛み
脳浮腫 のうふしゅ	頭痛、めまい、意識の低下、視力の低下、深く大きい呼吸
頭蓋内圧上昇 とうがい (ずがい) ないあつじょうしょう	頭痛、嘔吐 (おうと)、意識がうすれる、けいれん
麻痺性イレウス まひせいイレウス	吐き気、嘔吐 (おうと)、食欲不振、激しい腹痛、お腹がはる、便が出ない
血栓症 (深部静脈血栓症など) けっせんしょう (しんぶじょうみやくけっせんしょう)	皮膚や唇・手足の爪が青紫色～暗紫色になる、足の激しい痛み、下肢のむくみ
塞栓症 (肺塞栓症など) そくせんしょう (はいそくせんしょう)	胸をしめつけられる感じ、胸の痛み、息苦しい、咳、足の激しい痛み、汗をかく、意識の低下
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、赤褐色尿
腫瘍崩壊症候群 しゅようほうかいしょうこうぐん	脇腹の痛み、血尿
肺高血圧症 はいこうけつあつしょう	疲れやすい、胸の痛み、動く時の息切れ、気を失う

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	高熱、発熱、体がだるい、さむけ、関節の痛み、けいれん、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、全身のむくみ、汗をかく、かぜのような症状、貧血、立ちくらみ、ふらつき、脱力感、疲れやすい、片側のまひ
頭部	頭痛、めまい、意識の低下、意識がうすれる、考えがまとまらない
顔面	顔のむくみ、鼻血、ほてり
眼	結膜のただれ、まぶたや眼の充血、白目が黄色くなる、視力の低下、眼のまわりのはれ
口や喉	吐き気、嘔吐（おうと）、もどす、歯ぐきの出血、咳、から咳、痰がでる、唇や口内のただれ、ひどい口内炎、血を吐く、口の渇き、喉の痛み、しゃべりにくい、しゃがれ声、唇が青紫色～暗紫色になる、口唇のまわりのはれ
胸部	息切れ、息苦しい、吐き気、深く大きい呼吸、横になるより座っている時に呼吸が楽になる、胸の痛み、胸をしめつけられる感じ、動悸（どうき）、動く時の息切れ、むかむかする
腹部	食欲不振、食欲低下、吐き気、お腹がはる、激しい腹痛、脇腹の痛み、むかむかする
手・足	手足のまひ・しびれ、羽ばたくような手のふるえ、足の激しい痛み、関節の痛み、手足のむくみ、下肢のむくみ、手足の爪が青紫色～暗紫色になる、手足のこわばり、半身不随、片側のまひ
皮膚	かゆみ、赤い発疹（ほっしん）、痛みのある赤い肌、全身の発赤、全身の赤い斑点と破れやすい水ぶくれ（水疱）、中央にむくみをともなった赤い斑点、皮膚がはがれおちる、あおあざができる、皮膚が青紫色～暗紫色になる、皮膚が黄色くなる、じんましん、発疹（ほっしん）やみずぶくれができる、かさぶた
筋肉	筋肉の痛み
便	血が混ざった便、便がでない、黒色便
尿	尿量が減る、尿の色が濃くなる、赤褐色尿、血尿
その他	出血しやすい、出血が止まりにくい、陰部の痛み、気を失う、判断力の低下、意識を失って深く眠りこむ

## 【この薬の形は？】

形状	くすんだ黄赤色～濃い黄赤色の片面割線入りのフィルムコーティング錠
	
直径	約 9.2mm
厚さ	約 3.7mm
質量	約 197mg
識別コード	イマチニブ 100 EE

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	イマチニブメシル酸塩
添加物	クロスポビドン、無水ケイ酸、セルロース、三二酸化鉄、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：エルメッド エーザイ株式会社 (<http://www.emec.co.jp/>)  
エーザイ hhc ホットライン  
電話：0120-223-698  
受付時間：平日 9:00～18:00／土日・祝日 9:00～17:00