



カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げるお薬**です。



お薬の入ったPTPシートの裏面には、服用する月日を油性ペンで記入できる欄がございます。





飲み忘れ防止に、お役立て下さい

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。


裏面もお読み下さい ▶

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げるお薬**です。



お薬の入ったPTPシートの裏面には、服用する月日を油性ペンで記入できる欄がございます。




飲み忘れ防止に、お役立て下さい

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。


裏面もお読み下さい ▶

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げるお薬**です。



お薬の入ったPTPシートの裏面には、服用する月日を油性ペンで記入できる欄がございます。




飲み忘れ防止に、お役立て下さい

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。


裏面もお読み下さい ▶

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げるお薬**です。



お薬の入ったPTPシートの裏面には、服用する月日を油性ペンで記入できる欄がございます。



飲み忘れ防止に、お役立て下さい

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

裏面もお読み下さい ▶

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、**服用しないで下さい。**
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



CODE CAN (1)004B 2018年3月作成

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 ELSAI エーザイ株式会社

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、**服用しないで下さい。**
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



CODE CAN (1)004B 2018年3月作成

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 ELSAI エーザイ株式会社

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、**服用しないで下さい。**
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



CODE CAN (1)004B 2018年3月作成

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 ELSAI エーザイ株式会社

カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 服用にあたって

- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、**服用しないで下さい。**
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。



CODE CAN (1)004B 2018年3月作成

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 ELSAI エーザイ株式会社