

カンデサルタンOD錠 2mg/4mg/8mg/12mg「EE」 を服用される患者様へ

このお薬は、
水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。

舌の上で
唾液を
含ませます



唾液と一緒に
飲み込みます



口に含んで唾液を含ませると、
フワッと溶けます。



速やかに水を吸収 ふわっと崩れる


服用にあたって

- 今まで服用されている薬と同じ効果のある薬です。
- 水で飲んでも、唾液で溶かして飲んでも効き目は変わりません。
- 寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起ることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。

このお薬は、**血圧を下げるお薬**です。

2mg表面 (60%表示)



4mg表面 (60%表示)



8mg表面 (60%表示)



12mg表面 (60%表示)



※イメージイラストのため実際の製品と異なる場合があります。



PTPシート表面



PTPシート裏面

お薬の入ったPTPシートの裏面には、服用開始月日を油性ペンで記入できる欄がございます。

Candesartan OD 8mg EE 8
月 日 ~ 月 日
ご自分で服用する月日を記入

飲み忘れ防止に、お役立て下さい

CODE CAN (1)005A 2017年5月作成