

カンデサルタンOD錠 2mg/4mg/8mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、

水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。

舌の上で
唾液を
含ませます



唾液と一緒に
飲み込みます



口に含んで唾液を含ませると、
ふわっと溶けます。



速やかに水を吸収

ふわっと崩れる

服用にあたって


- 今まで服用されている薬と同じ効果のある薬です。
- 水で飲んでも、唾液で溶かして飲んでも効き目は変わりません。
- 寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- **妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。**
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- 本錠服用により、血圧が低下することがあります。このため、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。

裏面もお読み下さい ➡

このお薬は、軽症～中等症の慢性心不全の治療に用いるお薬です。

2mg表面 (60%表示)



4mg表面 (60%表示)



8mg表面 (60%表示)



PTPシート表面



PTPシート裏面

お薬の入ったPTPシートの裏面には、服用開始月日を油性ペンで記入できる欄がございます。

Candesartan OD 8mg [EEJ] 8
月 日 ~ 月 日
ご自分で服用する月日を記入
カンデサルタン カンデサルタン

飲み忘れ防止に、お役立て下さい

CODE CAN (1)008A 2017年5月作成