

セフトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」

体重別換算表



【性状】 だいたい色の細粒で芳香を有する

【含量】 1g中セフトレンピボキシルを100mg(力価)含有

【用法・用量】

〈肺炎、中耳炎、副鼻腔炎の場合〉

通常、小児にはセフトレンピボキシルとして1回3mg(力価)/kg(本剤0.03g/kg)を1日3回食後に経口投与する。

なお、必要に応じて1回6mg(力価)/kg(本剤0.06g/kg)まで投与できるが、成人での上限用量の1回200mg(力価)(本剤2g)1日3回(1日600mg(力価)(本剤6g))を超えないこととする。

〈上記以外の疾患の場合〉

通常、小児にはセフトレンピボキシルとして1回3mg(力価)/kg(本剤0.03g/kg)を1日3回食後に経口投与する。

なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、成人での上限用量の1回200mg(力価)(本剤2g)1日3回(1日600mg(力価)(本剤6g))を超えないこととする。



セフトレンピボキシル小児用細粒10%「EMEC」

体重別換算表

体重(kg)	1回 投与量	1日 投与量
	本剤(g)	本剤(g)
5	0.15	0.45
6	0.18	0.54
7	0.21	0.63
8	0.24	0.72
9	0.27	0.81
10	0.30	0.90
11	0.33	0.99
12	0.36	1.08
13	0.39	1.17
14	0.42	1.26
15	0.45	1.35
16	0.48	1.44
17	0.51	1.53
18	0.54	1.62
19	0.57	1.71
20	0.60	1.80
21	0.63	1.89
22	0.66	1.98
23	0.69	2.07
24	0.72	2.16
25	0.75	2.25
26	0.78	2.34
27	0.81	2.43

体重(kg)	1回 投与量	1日 投与量
	本剤(g)	本剤(g)
28	0.84	2.52
29	0.87	2.61
30	0.90	2.70
31	0.93	2.79
32	0.96	2.88
33	0.99	2.97
34	1.02	3.06
35	1.05	3.15
36	1.08	3.24
37	1.11	3.33
38	1.14	3.42
39	1.17	3.51
40	1.20	3.60
41	1.23	3.69
42	1.26	3.78
43	1.29	3.87
44	1.32	3.96
45	1.35	4.05
46	1.38	4.14
47	1.41	4.23
48	1.44	4.32
49	1.47	4.41
50	1.50	4.50



エルメッド エーザイ株式会社

CODE PCD(2)001SA
2013年8月作成