

クラリスロマイシンDS10%小児用「EMEC」の飲ませ方

この薬は、小さいお子さまにも飲みやすいストロベリー味のお薬です。

お薬の1回量を小さな容器に入れて、少量の水を加え、よくかき混ぜて飲むようにします。

飲ませ方の POINT

- ・1回に飲みきれる量の水に混ぜてください。
- ・容器に薬が残っていたら、水を少し足して飲ませ、飲み残しのないようにしてください。
- ・口の中に残ったお薬で苦くなることがあります。
お薬を飲ませ終わった後には、必ず水を飲ませて
ください。

★乳幼児への飲ませ方のコツ★

スプーンを使って



流し込む

保護者の指を使って



少量の水でねって
ペースト状にしたお薬を
上あごに塗りつける

スポイトを使って



手早く流し込む



エルメッド エーザイ株式会社

★飲みやすくする工夫★



一緒に混ぜると飲みやすくなる飲食物

牛乳※ ミルクココアパウダー ミルクパウダー
アイスクリーム プリン など

お薬を飲ませる直前に混ぜてください。

※牛乳に混ぜると味が変わり、牛乳を嫌うことがありますので注意してください。



一緒に混ぜると苦みが出る飲食物

フルーツジュース（オレンジ、リンゴ等）
スポーツドリンク 乳酸飲料 ヨーグルト など
酸味のあるものに混ぜると苦くなります。

注意!

- ・このお薬は、水に混ぜたまま放置すると苦みが出てくる場合があります。飲ませる直前に水に混ぜてください。
- ・他のお薬と一緒に飲むと苦くなることがあります。医師や薬剤師の指示がないときは、他のお薬と混ぜて飲ませないでください。

医療機関名