

～大切な注意です。必ずお読みください～

クロピドグレル錠 25mg/50mg/75mg「EE」を 服用される患者さまへ

このお薬の服用にあたっては、医師・薬剤師の指示に従い、
薬の飲み方を守ってください。



このお薬を飲んで、いつもと違う以下のような症状に気がいたら、
ただちに医師または薬剤師に連絡し、指示に従ってください。

- 皮膚が黄色くなる
- うとうとする、意識が低下する
- 皮膚にあざができたり、ぶつぶつができる
- 鼻や歯ぐきからの出血がある
- 白眼が黄色くなる
- 尿が茶色っぽくなる
- 気分が悪い
- かせのような症状
(熱が出る、さむけがする、のどが痛む)
- 強い疲労感、食欲低下がある

このお薬は血栓(血のかたまり)ができて血管がつまるのを防ぐお薬です。

- 1日1回服用してください。
- 飲み忘れたとしても、次の日に2回分を一度に服用しないでください。
- 誤って他の人が服用することがないように厳重に保管してください。
- 飲み残したお薬はすべて廃棄してください。

裏面もお読みください

クロピドグレル錠25mg/50mg/75mg「EE」 を服用される患者さまへ

診療を受ける病院・医院が変わったときは、
このカードをお見せください。

氏名

クロピドグレル錠「EE」

mg錠 ×

錠/日

服用開始日:

年

月

日

病・医院名/
電話:



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE CLO(1)002
2015年3月作成