

EEエスワン配合錠 を服用される方へ

服用上の注意

監修：峯 徹哉 先生

日本消化器内視鏡学会 理事

東海大学医学部医学科 内科学系消化器内科学 領域主任教授

お薬を飲む前に必ずお読みください

EEエスワン配合錠 T20

実物大



長・短径
約9.7mm×
約5.1mm

質量
約148mg

厚さ
約3.7mm

EEエスワン配合錠 T25

実物大




直径
約7.6mm

質量
約185mg

厚さ
約3.8mm



表



裏



表



裏

PTPシートの裏面に飲みはじめた日を記入できます。

飲み忘れ防止にお役立てください。

重要な注意事項

併用してはいけないお薬について

EEエスワン配合錠には、絶対に併用してはいけないお薬があります。

(フッ化ピリミジン系抗がん剤)

- 5-FU (ファイブエフユー)
- ユーエフティ
- フトラフル
- フルツロン
- ゼローダ
- ユーゼル・ユーエフティ
- ロイコボリン・ユーエフティ
- アイソボリン・5-FU など

(フッ化ピリミジン系抗真菌剤)

- アンコチル

- フェニトイン(てんかんの薬)、ワルファリンカリウム(血液を固まりにくくする薬)は、併用に注意が必要です。
- 今、服用しているお薬(薬局で購入されたお薬も含まれます)との併用についても、医師や薬剤師に必ず確認してください。
- 以前に処方されたお薬が自宅にまだ残っている場合は、自分でお薬を勝手に服用してはいけません。
- ほかの医療機関を受診するときは、必ずEEエスワン配合錠を服用していることを伝えてください。



EEエスワン配合錠の服用方法

1日2回、朝食後と夕食後にそれぞれ食後30分をめやすに服用してください。

- 空腹時の服用はさけてください。
- あなたの身長と体重をもとに、体の状態を考えて、お薬の量と服薬のスケジュールが決められています。

担当の医師の指示にしたがって、決められた量を決められたスケジュールで服用してください。

治療(服用)スケジュール

通常の治療の場合、28日間、毎日服用を続け、その後14日間休みます(休薬期間※)。

実際の治療スケジュールは、あなたの状態や副作用の程度を確認しながら調整されます。詳しくは、担当の医師に確認してください。

※休薬期間は、体に負担がかかり過ぎないようにするために必要な期間です。

- お薬を飲み忘れたときは、飲み忘れた分は服用せず、次の分(次の服用のタイミング)から通常量(1回分の量)を服用してください。

注意! 絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。まちがえて多く飲んでしまった場合は、すぐに担当の医師または薬剤師に連絡してください。



以下の症状が現れたときは、すぐに担当の医師に連絡してください!

風邪に似た症状



尿の変化・出血



お腹や口の症状



皮膚や目の症状



その他



EEエスワン配合錠の副作用について

おもな副作用と発現時期

副作用の現れ方や症状の程度、発現時期には個人差があります。自覚症状のない副作用もありますので、治療中は定期的に、血液検査を受けるようにしましょう。

主な副作用と発現時期

発現時期	1週	2週	3週	4週	5週	6週
骨髄機能の抑制		白血球減少				
			赤血球減少(貧血)			
		血小板減少				
消化器			食欲不振			
	吐き気					
		下痢				
			口内炎			
皮膚			色素沈着			
			発疹			

こんな時は我慢せず、 すぐに担当の医師へ連絡してください

- 発熱(38℃以上の熱)、乾咳
- 下痢(激しい下痢、長く続く下痢、普段より1日4回以上多い軟便)
- 口内炎(広い範囲に痛みがある・食事がとれない)
- 飲み始めて数日以内に下痢と口内炎が同時に現れる
- 吐き気、嘔吐(症状が強い、長く続く、食事がとれない)
- 流涙、目の痛み
- 出血、血便
- 極度の疲労感、めまい
- 全身の発疹

医療機関名



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE EES(1)004A

2017年6月作成