

# EEIスワン配合錠を服用される方へ

このお薬の成分は、  
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムです。

## EEIスワン配合錠 T20 EEIスワン配合錠 T25



### 服用の注意点

1日2回、朝食後と夕食後にそれぞれ食後30分をめやすに服用してください。

- 空腹時の服用はさけてください。
- あなたの身長と体重をもとに、体の状態を考えて、お薬の量と服薬のスケジュールが決まっています。担当の医師の指示にしたがって、決められた量を決められたスケジュールで服用してください。
- お薬を飲み忘れたときは、飲み忘れた分は服用せず、次の分(次の服用のタイミング)から通常量(1回分の量)を服用してください。
- PTPシートの裏面に、飲みはじめた日を記入できますので、飲み忘れ防止にお役立ていただけます。

**注意!** 絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。まちがえて多く飲んでしまった場合は、すぐに担当の医師または薬剤師に連絡してください。



裏面も必ずお読み下さい

# EEIスワン配合錠を服用される方へ

このお薬の成分は、  
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムです。

## EEIスワン配合錠 T20 EEIスワン配合錠 T25



### 服用の注意点

1日2回、朝食後と夕食後にそれぞれ食後30分をめやすに服用してください。

- 空腹時の服用はさけてください。
- あなたの身長と体重をもとに、体の状態を考えて、お薬の量と服薬のスケジュールが決まっています。担当の医師の指示にしたがって、決められた量を決められたスケジュールで服用してください。
- お薬を飲み忘れたときは、飲み忘れた分は服用せず、次の分(次の服用のタイミング)から通常量(1回分の量)を服用してください。
- PTPシートの裏面に、飲みはじめた日を記入できますので、飲み忘れ防止にお役立ていただけます。

**注意!** 絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。まちがえて多く飲んでしまった場合は、すぐに担当の医師または薬剤師に連絡してください。



裏面も必ずお読み下さい

# EEIスワン配合錠を服用される方へ

このお薬の成分は、  
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムです。

## EEIスワン配合錠 T20 EEIスワン配合錠 T25



### 服用の注意点

1日2回、朝食後と夕食後にそれぞれ食後30分をめやすに服用してください。

- 空腹時の服用はさけてください。
- あなたの身長と体重をもとに、体の状態を考えて、お薬の量と服薬のスケジュールが決まっています。担当の医師の指示にしたがって、決められた量を決められたスケジュールで服用してください。
- お薬を飲み忘れたときは、飲み忘れた分は服用せず、次の分(次の服用のタイミング)から通常量(1回分の量)を服用してください。
- PTPシートの裏面に、飲みはじめた日を記入できますので、飲み忘れ防止にお役立ていただけます。

**注意!** 絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。まちがえて多く飲んでしまった場合は、すぐに担当の医師または薬剤師に連絡してください。



裏面も必ずお読み下さい

# EEIスワン配合錠を服用される方へ

このお薬の成分は、  
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムです。

## EEIスワン配合錠 T20 EEIスワン配合錠 T25



### 服用の注意点

1日2回、朝食後と夕食後にそれぞれ食後30分をめやすに服用してください。

- 空腹時の服用はさけてください。
- あなたの身長と体重をもとに、体の状態を考えて、お薬の量と服薬のスケジュールが決まっています。担当の医師の指示にしたがって、決められた量を決められたスケジュールで服用してください。
- お薬を飲み忘れたときは、飲み忘れた分は服用せず、次の分(次の服用のタイミング)から通常量(1回分の量)を服用してください。
- PTPシートの裏面に、飲みはじめた日を記入できますので、飲み忘れ防止にお役立ていただけます。

**注意!** 絶対に2回分を一度に飲まないようにしてください。まちがえて多く飲んでしまった場合は、すぐに担当の医師または薬剤師に連絡してください。




裏面も必ずお読み下さい

こんな時は我慢せず、  
すぐに担当の医師へ連絡してください。

- 発熱 (38℃以上の熱)、乾咳
- 下痢 (激しい下痢、長く続く下痢、  
普段より1日4回以上多い軟便)
- 口内炎 (広い範囲に痛みがある・  
食事がとれない)
- 飲み始めて数日以内に下痢と  
口内炎が同時に現れる
- 吐き気、嘔吐 (症状が強い、  
長く続く、食事がとれない)
- 流涙、目の痛み
- 出血、血便
- 極度の疲労感、めまい
- 全身の発疹



エルメッド エーザイ株式会社




エーザイ株式会社


CODE EES(1)005A  
2017年6月作成

こんな時は我慢せず、  
すぐに担当の医師へ連絡してください。

- 発熱 (38℃以上の熱)、乾咳
- 下痢 (激しい下痢、長く続く下痢、  
普段より1日4回以上多い軟便)
- 口内炎 (広い範囲に痛みがある・  
食事がとれない)
- 飲み始めて数日以内に下痢と  
口内炎が同時に現れる
- 吐き気、嘔吐 (症状が強い、  
長く続く、食事がとれない)
- 流涙、目の痛み
- 出血、血便
- 極度の疲労感、めまい
- 全身の発疹



エルメッド エーザイ株式会社




エーザイ株式会社


CODE EES(1)005A  
2017年6月作成

こんな時は我慢せず、  
すぐに担当の医師へ連絡してください。

- 発熱 (38℃以上の熱)、乾咳
- 下痢 (激しい下痢、長く続く下痢、  
普段より1日4回以上多い軟便)
- 口内炎 (広い範囲に痛みがある・  
食事がとれない)
- 飲み始めて数日以内に下痢と  
口内炎が同時に現れる
- 吐き気、嘔吐 (症状が強い、  
長く続く、食事がとれない)
- 流涙、目の痛み
- 出血、血便
- 極度の疲労感、めまい
- 全身の発疹



エルメッド エーザイ株式会社




エーザイ株式会社


CODE EES(1)005A  
2017年6月作成

こんな時は我慢せず、  
すぐに担当の医師へ連絡してください。

- 発熱 (38℃以上の熱)、乾咳
- 下痢 (激しい下痢、長く続く下痢、  
普段より1日4回以上多い軟便)
- 口内炎 (広い範囲に痛みがある・  
食事がとれない)
- 飲み始めて数日以内に下痢と  
口内炎が同時に現れる
- 吐き気、嘔吐 (症状が強い、  
長く続く、食事がとれない)
- 流涙、目の痛み
- 出血、血便
- 極度の疲労感、めまい
- 全身の発疹



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE EES(1)005A  
2017年6月作成