

イマチニブ錠 100mg「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、イマチニブメシル酸塩です。



服用の注意点

- このお薬は毎日続けて服用しないとお薬の効果はあらわれません。自分の判断で**服用を中止したり服用量を変えたり**しないでください。
- 胃などの負担を軽くするために、**食後に多めの水**で服用してください。
- このお薬を服用中は**グレープフルーツジュースやセイヨウトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を避けてください。**
- お薬の効果の確認や副作用を早くみつけるためにも**定期的に診療・検査を受けてください。**
- 他の医師を受診する場合や薬局などで他の薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

イマチニブ錠 100mg「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、イマチニブメシル酸塩です。



服用の注意点

- このお薬は毎日続けて服用しないとお薬の効果はあらわれません。自分の判断で**服用を中止したり服用量を変えたり**しないでください。
- 胃などの負担を軽くするために、**食後に多めの水**で服用してください。
- このお薬を服用中は**グレープフルーツジュースやセイヨウトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を避けてください。**
- お薬の効果の確認や副作用を早くみつけるためにも**定期的に診療・検査を受けてください。**
- 他の医師を受診する場合や薬局などで他の薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

イマチニブ錠 100mg「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、イマチニブメシル酸塩です。



服用の注意点

- このお薬は毎日続けて服用しないとお薬の効果はあらわれません。自分の判断で**服用を中止したり服用量を変えたり**しないでください。
- 胃などの負担を軽くするために、**食後に多めの水**で服用してください。
- このお薬を服用中は**グレープフルーツジュースやセイヨウトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を避けてください。**
- お薬の効果の確認や副作用を早くみつけるためにも**定期的に診療・検査を受けてください。**
- 他の医師を受診する場合や薬局などで他の薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

イマチニブ錠 100mg「EE」

を服用される方へ

このお薬の成分は、イマチニブメシル酸塩です。



服用の注意点

- このお薬は毎日続けて服用しないとお薬の効果はあらわれません。自分の判断で**服用を中止したり服用量を変えたり**しないでください。
- 胃などの負担を軽くするために、**食後に多めの水**で服用してください。
- このお薬を服用中は**グレープフルーツジュースやセイヨウトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品を避けてください。**
- お薬の効果の確認や副作用を早くみつけるためにも**定期的に診療・検査を受けてください。**
- 他の医師を受診する場合や薬局などで他の薬を購入される場合は、必ずこのお薬を服用していることを医師または薬剤師にお伝えください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

▼ 裏面もお読みください

服用中に次のような症状がみられたら、
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。



出血しやすい
出血がとまりにくい



重度の
発熱・悪寒



激しい腹痛
血便



長く続く
吐き気、嘔吐



全身のむくみ
急激な体重増加

医療機関名

CODE IMA(1)005
2013年12月作成

服用中に次のような症状がみられたら、
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。



出血しやすい
出血がとまりにくい



重度の
発熱・悪寒



激しい腹痛
血便



長く続く
吐き気、嘔吐



全身のむくみ
急激な体重増加

医療機関名

CODE IMA(1)005
2013年12月作成

服用中に次のような症状がみられたら、
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。



出血しやすい
出血がとまりにくい



重度の
発熱・悪寒



激しい腹痛
血便



長く続く
吐き気、嘔吐



全身のむくみ
急激な体重増加

医療機関名

CODE IMA(1)005
2013年12月作成

服用中に次のような症状がみられたら、
すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。



出血しやすい
出血がとまりにくい



重度の
発熱・悪寒



激しい腹痛
血便



長く続く
吐き気、嘔吐



全身のむくみ
急激な体重増加

医療機関名

CODE IMA(1)005
2013年12月作成