

# 硝酸イソルビドテ-740mg「EMEC」を ご使用される患者さんへ



## このくすりの作用

- このくすりは、皮膚に貼ることで有効成分が皮膚から吸収され、心臓に血液を送っている冠動脈とよばれる血管を広げ、血流を増やす働きがあります。

## このくすりの使い方

- 医師の指示にしたがって、正しくご使用ください(『くすりを貼る場所』『くすりの貼り方』をご参照ください)。
- 貼り忘れた場合:気がついた時、できるだけ早く貼ってください。

### ワンポイントアドバイス


テープの上にマジック等で貼付日を書いておかれると貼り忘れや貼り間違いを防げます。

## くすりを貼る場所

- 医師の指示にしたがって、胸部、上腹部又は背部のどちらかの平らな部分に貼ってください。

### ワンポイントアドバイス

- ①貼る場所を清潔なタオルなどでよく拭いてから貼ってください。
- ②次のような部位に貼るのは、避けたほうがよいでしょう。
  - ・正中線付近(図参照)など、汗をかきやすい部分
  - ・曲げ伸ばしなど動きの激しい部分
  - ・体毛の多い部分



裏面もお読みください。

CODE TIS(1) 009E  
2016年6月作成

# 硝酸イソルビドテ-740mg「EMEC」を ご使用される患者さんへ



## このくすりの作用

- このくすりは、皮膚に貼ることで有効成分が皮膚から吸収され、心臓に血液を送っている冠動脈とよばれる血管を広げ、血流を増やす働きがあります。

## このくすりの使い方

- 医師の指示にしたがって、正しくご使用ください(『くすりを貼る場所』『くすりの貼り方』をご参照ください)。
- 貼り忘れた場合:気がついた時、できるだけ早く貼ってください。

### ワンポイントアドバイス


テープの上にマジック等で貼付日を書いておかれると貼り忘れや貼り間違いを防げます。

## くすりを貼る場所

- 医師の指示にしたがって、胸部、上腹部又は背部のどちらかの平らな部分に貼ってください。

### ワンポイントアドバイス

- ①貼る場所を清潔なタオルなどでよく拭いてから貼ってください。
- ②次のような部位に貼るのは、避けたほうがよいでしょう。
  - ・正中線付近(図参照)など、汗をかきやすい部分
  - ・曲げ伸ばしなど動きの激しい部分
  - ・体毛の多い部分



裏面もお読みください。


CODE TIS(1) 009E  
2016年6月作成

## このくすりを使用する際の注意点

- 頭痛や血圧低下などが起こることがあります。何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。
- 服用しているおくすりを医師・薬剤師に伝えてください。なお、バイアグラ®錠（シルденаフィルクエン酸塩錠）などの勃起不全治療薬などは絶対に服用しないでください。
- 主治医の指示なしに、自分の判断で貼るのをやめないでください。

## くすりの貼り方 図の手順にしたがって貼ってください。

**1** 白色のフィルムの片方をはがし、半透明のテープを皮膚に貼ってください。



### ワンポイントアドバイス

片方のフィルムを半分くらいまではがして、粘着面を身体に貼りつけてからフィルムをはがすとうまく貼れます。

**2** もう片方のフィルムは、テープを皮膚に貼りながらはがしてください。



**3** テープがしわにならないよう注意して貼ってください。最後に、テープ全体を手のひらでよく押さえてしっかりと貼ってください。




- 同じ場所に続けて貼ると、皮膚が赤くなったり、かゆみ、かぶれなどが生じることがありますので、貼りがえるときは場所をかえて貼ってください。また、これらの皮膚症状があらわれた場合には、医師にご相談ください。
- アルミ袋開封後は早めにご使用ください。

## このくすりを使用する際の注意点

- 頭痛や血圧低下などが起こることがあります。何か変だなと感じたら、主治医または薬剤師に相談してください。
- 服用しているおくすりを医師・薬剤師に伝えてください。なお、バイアグラ®錠（シルденаフィルクエン酸塩錠）などの勃起不全治療薬などは絶対に服用しないでください。
- 主治医の指示なしに、自分の判断で貼るのをやめないでください。

## くすりの貼り方 図の手順にしたがって貼ってください。

**1** 白色のフィルムの片方をはがし、半透明のテープを皮膚に貼ってください。




### ワンポイントアドバイス

片方のフィルムを半分くらいまではがして、粘着面を身体に貼りつけてからフィルムをはがすとうまく貼れます。

**2** もう片方のフィルムは、テープを皮膚に貼りながらはがしてください。



**3** テープがしわにならないよう注意して貼ってください。最後に、テープ全体を手のひらでよく押さえてしっかりと貼ってください。



- 同じ場所に続けて貼ると、皮膚が赤くなったり、かゆみ、かぶれなどが生じることがありますので、貼りがえるときは場所をかえて貼ってください。また、これらの皮膚症状があらわれた場合には、医師にご相談ください。
- アルミ袋開封後は早めにご使用ください。