

# ピタバスタチンCa錠1mg/2mg/4mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は血液中のコレステロールを減らすお薬です。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

## 服用の注意点

- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、腹痛、発疹、倦怠感、しびれ、かゆみ、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。服用量が増えた方は特にご注意下さい。

裏面も必ずお読み下さい 

# ピタバスタチンCa錠1mg/2mg/4mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は血液中のコレステロールを減らすお薬です。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

## 服用の注意点

- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、腹痛、発疹、倦怠感、しびれ、かゆみ、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。服用量が増えた方は特にご注意下さい。

裏面も必ずお読み下さい 

# ピタバスタチンCa錠1mg/2mg/4mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は血液中のコレステロールを減らすお薬です。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

## 服用の注意点

- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、腹痛、発疹、倦怠感、しびれ、かゆみ、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。服用量が増えた方は特にご注意下さい。

裏面も必ずお読み下さい 

# ピタバスタチンCa錠1mg/2mg/4mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は血液中のコレステロールを減らすお薬です。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック(後発)医薬品です。

## 服用の注意点

- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、腹痛、発疹、倦怠感、しびれ、かゆみ、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

## お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」\*が起ることが知られています。次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。服用量が増えた方は特にご注意下さい。


裏面も必ずお読み下さい 



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。また、ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

※「**横紋筋融解症**」とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。



2019年4月作成 N201900067



副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば大事に至ることはほとんどありません。また、ほかにもお薬を服用して体調がおかしいと感じましたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談下さい。

※「**横紋筋融解症**」とは

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎障害(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

