

# ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**骨粗しょう症の治療に使われる**お薬です。また、患者さまのお薬代の負担が軽減される**ジェネリック(後発)医薬品**です。

実物大

ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「EE」  
エルメッド エーザイ

ラロキシフェン60

ラロキシフェン60

ラロキシフェン  
EE

ラロキシフェン  
EE

骨粗しょう症の薬

1日1回

※イメージイラストのため実際の製品と異なる場合があります。

お薬が従来のもので変わりましたが、  
お薬の成分・効果は変わりありませんので、  
今まで通りお飲みください。



骨粗しょう症のお薬は、継続して服用することによって効果が得られますので、  
主治医の指示通りに服用して下さい。



裏面も必ず  
お読み下さい。




## 服用上の注意

- 手術後や長期に体を動かさない状態になる場合は、3日前までに薬の服用を休止する必要があるので、主治医にご相談ください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。

## お薬の副作用について

- このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



片方のふくらはぎが赤く腫れる  
ふくらはぎを押すと痛む



急に息苦しく感じる  
胸苦しさを感ずる



急に視力が低下する



全身けん怠感  
食欲不振  
吐き気等



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社