

# ラロキシフェン<sup>塩酸塩錠</sup> 60mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**骨粗しょう症の治療に使われる**お薬です。また、患者さまのお薬代の負担が軽減される**ジェネリック(後発)医薬品**です。



骨粗しょう症のお薬は、継続して服用することによって効果が得られますので、**主治医の指示通りに服用して下さい。**



裏面も必ず  
お読み下さい。▶▶▶

# ラロキシフェン<sup>塩酸塩錠</sup> 60mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**骨粗しょう症の治療に使われる**お薬です。また、患者さまのお薬代の負担が軽減される**ジェネリック(後発)医薬品**です。



骨粗しょう症のお薬は、継続して服用することによって効果が得られますので、**主治医の指示通りに服用して下さい。**



裏面も必ず  
お読み下さい。▶▶▶

# ラロキシフェン<sup>塩酸塩錠</sup> 60mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**骨粗しょう症の治療に使われる**お薬です。また、患者さまのお薬代の負担が軽減される**ジェネリック(後発)医薬品**です。



骨粗しょう症のお薬は、継続して服用することによって効果が得られますので、**主治医の指示通りに服用して下さい。**



裏面も必ず  
お読み下さい。▶▶▶

# ラロキシフェン<sup>塩酸塩錠</sup> 60mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**骨粗しょう症の治療に使われる**お薬です。また、患者さまのお薬代の負担が軽減される**ジェネリック(後発)医薬品**です。



骨粗しょう症のお薬は、継続して服用することによって効果が得られますので、**主治医の指示通りに服用して下さい。**



裏面も必ず  
お読み下さい。▶▶▶

## 服用上の注意

- 手術後や長期に体を動かさない状態になる場合は、3日前までに薬の服用を休止する必要があるので、主治医にご相談ください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。

## お薬の副作用について

- このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



片方のふくらはぎが赤く腫れる  
ふくらはぎを押すと痛む

急に息苦しく感じる  
胸苦しさを感

急に視力が低下する

全身けん怠感  
食欲不振  
吐き気等



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE RAL (1)002A  
2018年3月作成

## 服用上の注意

- 手術後や長期に体を動かさない状態になる場合は、3日前までに薬の服用を休止する必要があるので、主治医にご相談ください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。

## お薬の副作用について

- このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



片方のふくらはぎが赤く腫れる  
ふくらはぎを押すと痛む

急に息苦しく感じる  
胸苦しさを感

急に視力が低下する

全身けん怠感  
食欲不振  
吐き気等



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社


CODE RAL (1)002A  
2018年3月作成

## 服用上の注意

- 手術後や長期に体を動かさない状態になる場合は、3日前までに薬の服用を休止する必要があるので、主治医にご相談ください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。

## お薬の副作用について

- このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



片方のふくらはぎが赤く腫れる  
ふくらはぎを押すと痛む

急に息苦しく感じる  
胸苦しさを感

急に視力が低下する

全身けん怠感  
食欲不振  
吐き気等



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社


CODE RAL (1)002A  
2018年3月作成

## 服用上の注意

- 手術後や長期に体を動かさない状態になる場合は、3日前までに薬の服用を休止する必要があるので、主治医にご相談ください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。

## お薬の副作用について

- このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



片方のふくらはぎが赤く腫れる  
ふくらはぎを押すと痛む

急に息苦しく感じる  
胸苦しさを感

急に視力が低下する

全身けん怠感  
食欲不振  
吐き気等



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社

CODE RAL (1)002A  
2018年3月作成