

ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血液中のコレステロールを減らす**お薬です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。



服用にあたって

- ◆水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。
- ◆寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、筋肉痛、かゆみ、発疹、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

裏面も必ずお読みください



ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血液中のコレステロールを減らす**お薬です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。



服用にあたって

- ◆水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。
- ◆寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、筋肉痛、かゆみ、発疹、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

裏面も必ずお読みください



ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血液中のコレステロールを減らす**お薬です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。



服用にあたって

- ◆水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。
- ◆寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、筋肉痛、かゆみ、発疹、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

裏面も必ずお読みください



ロスバスタチンOD錠2.5mg/5mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は**血液中のコレステロールを減らす**お薬です。

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。



服用にあたって

- ◆水なしでも飲むことができるOD錠（口腔内崩壊錠）です。
- ◆寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- ◆ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ◆主な副作用として、筋肉痛、かゆみ、発疹、じんましんなどが報告されています。このような症状に気づいたら主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

裏面も必ずお読みください

