

シンバスタチン錠 10mg/20mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らす
お薬です。

白色の素錠



(実物大)

こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が
軽減されるジェネリック（後発）医薬品です。

- ◆ **お水やぬるま湯と一緒に**
お飲みください。
- ◆ **ご自分の判断で服用を**
中止しないでください。



※ご不明な点は、
かかりつけの医師・薬剤師に
ご相談ください。

裏面も必ずお読みください 

お薬の副作用について

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「**横紋筋融解症**」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

- 筋肉が痛い
- 手足の力がはいらぬ
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

食品との相互作用について

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社