

シンバスタチン錠 5mg「EMEC」

を服用される患者様へ

この錠剤は、血液中のコレステロールを減らす
お薬です。

白色の割線入りの素錠



(実物大)

〈服用にあたって〉

◆少し大きめの錠剤ですが、水を含むと口の中ですぐに
「ふわっ」と崩れる錠剤です。



こちらのお薬は、患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック(後発)医薬品です。

※ご不明な点は、
かかりつけの医師・薬剤師に
ご相談ください。

裏面も必ずお読みください



〈お薬の副作用について〉

このお薬は、筋肉の副作用としてごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので直ちに服用をやめて、すぐに主治医の先生または薬剤師の先生にご相談ください。

- 筋肉が痛い
- 手足の力がはいらぬ
- 尿の色が濃い(赤褐色になる)

*横紋筋融解症とは:

筋肉が障害され、筋肉痛や脱力などの症状があらわれ、筋の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。赤褐色の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全(腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる)になることもあります。

〈食品との相互作用について〉

このお薬を服薬中は、グレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは、避けてください(このお薬の作用が強くなることがあります)。



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社