

# テルミサルタン錠20mg/40mg/80mg「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる** お薬です。

20mg チェック

テルミサルタン錠20mg「EE」  
エルメッド エーザイ

テルミサルタン20	テルミサルタン20
	
20	20
高血圧症の薬	高血圧症の薬
テルミサルタン20	テルミサルタン20
	
20	20




40mg チェック

テルミサルタン錠40mg「EE」  
エルメッド エーザイ

テルミサルタン40	テルミサルタン40
	
40	40
高血圧症の薬	高血圧症の薬
テルミサルタン40	テルミサルタン40
	
40	40

80mg チェック

テルミサルタン錠80mg「EE」  
エルメッド エーザイ

テルミサルタン80	テルミサルタン80
	
80	80
高血圧症の薬	高血圧症の薬
テルミサルタン80	テルミサルタン80
	
80	80

(すべて90%表示)

※イメージイラストのため実際の製品と異なる場合があります。



こちらのお薬は、  
患者様のお薬代の負担が軽減される  
ジェネリック(後発)医薬品です。

先発品と有効成分・効果・効能は変わ  
りありません。

**飲み忘れに注意しましょう!**

高血圧はさまざまな病気の原因となることがわかっています。  
血圧はいつでもコントロールしておくことが大切です。

高温多湿をさけて、涼しいところに保管してください。

裏面もお読み下さい ➡

# テルミサルタン錠 20mg/40mg/80mg「EE」

## 服用上の注意

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。

## お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



発熱、  
意識の低下



食欲不振



皮膚が  
黄色くなる



筋肉の痛み



手足の  
こわばり、  
しびれ



尿の色が  
赤褐色になる



エルメッド エーザイ株式会社



エーザイ株式会社