

テラム®配合錠AP/BP「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分**である**テルミサルタン**と**アムロジピン**の2つが配合されたお薬です。

AP チェック <input type="checkbox"/>	BP チェック <input type="checkbox"/>
テラム®配合錠AP「EE」 テルミサルタン 40mg アムロジピン 5mg テラムロAP テラムロAP AP AP 高血圧症の薬 高血圧症の薬	テラム®配合錠BP「EE」 テルミサルタン 80mg アムロジピン 5mg テラムロBP テラムロBP BP BP 高血圧症の薬 高血圧症の薬



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。

飲み忘れに注意しましょう！

高血圧はさまざまな病気の原因となることがわかっています。
血圧はいつでもコントロールしておくことが大切です。

高温多湿をさせて、涼しいところに保管してください。

裏面もお読み下さい ➡

テラム®配合錠AP/BP「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分**である**テルミサルタン**と**アムロジピン**の2つが配合されたお薬です。

AP チェック <input type="checkbox"/>	BP チェック <input type="checkbox"/>
テラム®配合錠AP「EE」 テルミサルタン 40mg アムロジピン 5mg テラムロAP テラムロAP AP AP 高血圧症の薬 高血圧症の薬	テラム®配合錠BP「EE」 テルミサルタン 80mg アムロジピン 5mg テラムロBP テラムロBP BP BP 高血圧症の薬 高血圧症の薬



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。

飲み忘れに注意しましょう！

高血圧はさまざまな病気の原因となることがわかっています。
血圧はいつでもコントロールしておくことが大切です。

高温多湿をさせて、涼しいところに保管してください。

裏面もお読み下さい ➡

テラム®配合錠AP/BP「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分**である**テルミサルタン**と**アムロジピン**の2つが配合されたお薬です。

AP チェック <input type="checkbox"/>	BP チェック <input type="checkbox"/>
テラム®配合錠AP「EE」 テルミサルタン 40mg アムロジピン 5mg テラムロAP テラムロAP AP AP 高血圧症の薬 高血圧症の薬	テラム®配合錠BP「EE」 テルミサルタン 80mg アムロジピン 5mg テラムロBP テラムロBP BP BP 高血圧症の薬 高血圧症の薬



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。

飲み忘れに注意しましょう！

高血圧はさまざまな病気の原因となることがわかっています。
血圧はいつでもコントロールしておくことが大切です。

高温多湿をさせて、涼しいところに保管してください。

裏面もお読み下さい ➡

テラム®配合錠AP/BP「EE」

を服用される患者様へ

このお薬は、**血圧を下げる成分**である**テルミサルタン**と**アムロジピン**の2つが配合されたお薬です。

AP チェック <input type="checkbox"/>	BP チェック <input type="checkbox"/>
テラム®配合錠AP「EE」 テルミサルタン 40mg アムロジピン 5mg テラムロAP テラムロAP AP AP 高血圧症の薬 高血圧症の薬	テラム®配合錠BP「EE」 テルミサルタン 80mg アムロジピン 5mg テラムロBP テラムロBP BP BP 高血圧症の薬 高血圧症の薬



こちらのお薬は、
患者様のお薬代の負担が軽減される
ジェネリック（後発）医薬品です。

飲み忘れに注意しましょう！

高血圧はさまざまな病気の原因となることがわかっています。
血圧はいつでもコントロールしておくことが大切です。

高温多湿をさせて、涼しいところに保管してください。

裏面もお読み下さい ➡

テラム®配合錠 AP/BP「EE」服用上の注意

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。
- このお薬を服用中はグレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなることがあります)

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE TER (1) 003A
2018年3月作成

テラム®配合錠 AP/BP「EE」服用上の注意

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。
- このお薬を服用中はグレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなることがあります)

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE TER (1) 003A
2018年3月作成

テラム®配合錠 AP/BP「EE」服用上の注意

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。
- このお薬を服用中はグレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなることがあります)

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE TER (1) 003A
2018年3月作成

テラム®配合錠 AP/BP「EE」服用上の注意

- 妊婦または妊娠している可能性のある患者様は、服用しないで下さい。この薬を使用中に妊娠が判明した場合は、ただちに主治医にご相談ください。
- 血圧が低下することにより、めまい、ふらつきが起こることがありますので、高いところでの作業、車の運転や危険を伴う機械の操作には注意してください。
- このお薬を服用中はグレープフルーツジュースを飲んだり、グレープフルーツを食べたりすることは避けてください。(このお薬の作用が強くなることがあります)

お薬の副作用について

このお薬を服用して次のような症状がみられましたら、服用を直ちにやめて、すぐに主治医または薬剤師の先生にご相談ください。



EMEC エルメッド エーザイ株式会社 Eisai エーザイ株式会社

CODE TER (1) 003A
2018年3月作成