


ツロブテロールテープ「EMEC」をご使用の方へ

- このお薬は、気管支を広げることで、気管支喘息、気管支炎などの息苦しさをやわらげます。
- テープは1日1回、入浴後の汗がひいた後などに時間帯を決めて貼りかえてください。

貼る場所

子供・大人関係なく胸、背中、
上腕のいずれか1カ所の平
らな部分に貼ってください。
(図参照)



貼り方のポイント

- 貼る前
 - ・貼る場所を乾いたタオルなどでよく拭きます。
 - ・汗をかきやすいところやクリーム、軟膏などをぬった部分には貼らないでください。
- 貼る時
 - ・ライナー（剥離紙）をはがす時、テープの接着面に指が触れないようにします。
- 貼った後
 - ・テープ全体と四隅をまんべんなく手でよく押さえてしっかりと貼ってください。

貼る時の注意

- 傷口や湿疹のあるところには貼らないでください。
- 本剤をはがす可能性がある子供には、手の届かない部位に貼ってください。
- 同じ場所に続けて貼ると、かゆみ、かぶれなどを生じることがあります。
新しいテープに貼りかえる時は場所をかえて貼ってください。
- テープが少しはがれた場合は、刺激の少ない絆創膏などで固定してください。




エルメッド エーサイ

CODE TTU(1)004C
2014年11月作成



ツロブテロールテープ「EMEC」の貼り方


0.5mg、1mg、2mgのテープがありますが、使い方はいずれも同じです。



あ


い

1



袋の上部あを切ります。

3



袋を左右に開きます。

5




青色の面を上にして、テープを軽く山折りにし、片方のライナーをはがします。

7




最後に、テープ全体と四隅をまんべんなく手でよく押さえてください。

2



裏返して袋の右端いを切ります。

4



丁寧にテープを袋から離します。

6



白色のテープ部分を皮膚に貼り、残りのライナーをすらしながら、テープを貼っていきます。