


バラシクロビル錠 500mg「EE」

を服用する患者さまへ

単純ヘルペスウイルスおよび
水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える薬です。



(実物大)



本剤が飲みにくい場合は、
服用直前に半分に割って
飲みやすくできます。
※割ると苦味が出やす
くなります。

服用にあたって

- 決められた用量を守って服用してください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

バラシクロビル錠 500mg「EE」

を服用する患者さまへ

単純ヘルペスウイルスおよび
水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える薬です。



(実物大)



本剤が飲みにくい場合は、
服用直前に半分に割って
飲みやすくできます。
※割ると苦味が出やす
くなります。

服用にあたって

- 決められた用量を守って服用してください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社


バラシクロビル錠 500mg「EE」

を服用する患者さまへ

単純ヘルペスウイルスおよび
水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える薬です。



(実物大)



本剤が飲みにくい場合は、
服用直前に半分に割って
飲みやすくできます。
※割ると苦味が出やす
くなります。

服用にあたって

- 決められた用量を守って服用してください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

バラシクロビル錠 500mg「EE」

を服用する患者さまへ

単純ヘルペスウイルスおよび
水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える薬です。



(実物大)



本剤が飲みにくい場合は、
服用直前に半分に割って
飲みやすくできます。
※割ると苦味が出やす
くなります。

服用にあたって

- 決められた用量を守って服用してください。
- お水やぬるま湯と一緒に飲みください。
- ご自分の判断で服用を中止しないでください。
- ご不明な点は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

EMEC エルメッド エーザイ株式会社 EISAI エーザイ株式会社

以下に該当する場合は、
このおくすりを服用する前に、
医師・薬剤師にご相談ください。

- **腎臓が悪い**と言われたことがある。
- 現在、**透析**を受けている。
- 最近、尿の量が少ない、
からだや手足がむくんでいる。

おくすりを服用後、
次のような症状はありませんか？

- めまい
- ふらつき
- 頭痛
- ふるえ
- 手足のしびれ感
- 筋肉のぴくつき
- 一時的にボーッと意識が薄れる

上記症状があらわれたら、**服用を中止し、**
すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

服用期間中は、普段より多めに
水分を取ってください。

※脱水状態になると副作用が起こりやすくなります。

CODE VCV(2)009
2018年3月作成

以下に該当する場合は、
このおくすりを服用する前に、
医師・薬剤師にご相談ください。

- **腎臓が悪い**と言われたことがある。
- 現在、**透析**を受けている。
- 最近、尿の量が少ない、
からだや手足がむくんでいる。

おくすりを服用後、
次のような症状はありませんか？

- めまい
- ふらつき
- 頭痛
- ふるえ
- 手足のしびれ感
- 筋肉のぴくつき
- 一時的にボーッと意識が薄れる

上記症状があらわれたら、**服用を中止し、**
すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

服用期間中は、普段より多めに
水分を取ってください。

※脱水状態になると副作用が起こりやすくなります。

CODE VCV(2)009
2018年3月作成

以下に該当する場合は、
このおくすりを服用する前に、
医師・薬剤師にご相談ください。

- **腎臓が悪い**と言われたことがある。
- 現在、**透析**を受けている。
- 最近、尿の量が少ない、
からだや手足がむくんでいる。

おくすりを服用後、
次のような症状はありませんか？

- めまい
- ふらつき
- 頭痛
- ふるえ
- 手足のしびれ感
- 筋肉のぴくつき
- 一時的にボーッと意識が薄れる

上記症状があらわれたら、**服用を中止し、**
すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

服用期間中は、普段より多めに
水分を取ってください。

※脱水状態になると副作用が起こりやすくなります。

CODE VCV(2)009
2018年3月作成

以下に該当する場合は、
このおくすりを服用する前に、
医師・薬剤師にご相談ください。

- **腎臓が悪い**と言われたことがある。
- 現在、**透析**を受けている。
- 最近、尿の量が少ない、
からだや手足がむくんでいる。

おくすりを服用後、
次のような症状はありませんか？

- めまい
- ふらつき
- 頭痛
- ふるえ
- 手足のしびれ感
- 筋肉のぴくつき
- 一時的にボーッと意識が薄れる

上記症状があらわれたら、**服用を中止し、**
すぐに医師・薬剤師にご相談ください。

服用期間中は、普段より多めに
水分を取ってください。

※脱水状態になると副作用が起こりやすくなります。

CODE VCV(2)009
2018年3月作成