

※2016年7月改訂（第3版）  
 ※2016年4月改訂（第2版）

処方箋医薬品<sup>注</sup>

日本標準商品分類番号	
※ 872149	(2mg/4mg/8mg/12mg)
872179	(2mg/4mg/8mg)

持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤

カンデサルタンOD錠2mg「EE」

カンデサルタンOD錠4mg「EE」

カンデサルタンOD錠8mg「EE」

カンデサルタンOD錠12mg「EE」

Candesartan OD tab. 2mg/4mg/8mg/12mg「EE」

〈カンデサルタン シレキセチル口腔内崩壊錠〉

〔貯 法〕 室温保存

〔使用期限〕 外箱又はラベルに表示の使用期限内に使用すること。

〔注〕 注意－医師等の処方箋により使用すること

	2mg	4mg
承認番号	22600AMX01049000	22600AMX01050000
※ 薬価収載	2014年12月	2014年12月
※ 販売開始	2014年12月	2014年12月
※ 効能追加	2016年4月	2016年4月

	8mg	12mg
承認番号	22600AMX01051000	22600AMX01052000
※ 薬価収載	2014年12月	2014年12月
※ 販売開始	2014年12月	2014年12月
※ 効能追加	2016年4月	

【禁 忌】（次の患者には投与しないこと）

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人  
 〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕
3. アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）〔非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加が報告されている。〕  
 〔「重要な基本的注意」の項参照〕

【組成・性状】

販売名	カンデサルタンOD錠2mg「EE」	カンデサルタンOD錠4mg「EE」				
有効成分 (1錠中)	カンデサルタン シレキセチル 2.0mg	カンデサルタン シレキセチル 4.0mg				
添加物	カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、ジメチルポリシロキサン（内服用）、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー					
性状・剤形	白色～帯黄白色のフィルムコートされた口腔内崩壊錠	白色～帯黄白色のフィルムコートされた割線入りの口腔内崩壊錠				
外形	表	裏	側面	表	裏	側面
直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm)	約7.0	約120	約3.2	約7.0	約120	約3.4
識別コード	カンデサルタン EE/OD 2		カンデサルタン EE/OD 4			

販売名	カンデサルタンOD錠8mg「EE」	カンデサルタンOD錠12mg「EE」				
有効成分 (1錠中)	カンデサルタン シレキセチル 8.0mg	カンデサルタン シレキセチル 12.0mg				
添加物	黄色三酸化鉄、カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、三酸化鉄、ジメチルポリシロキサン（内服用）、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー	黄色三酸化鉄、カルナウバロウ、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、三酸化鉄、ジメチルポリシロキサン（内服用）、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・グラフトコポリマー				
性状・剤形	ごくうすいだい色のフィルムコートされた割線入りの口腔内崩壊錠	うすいだい色のフィルムコートされた割線入りの口腔内崩壊錠				
外形	表	裏	側面	表	裏	側面
直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm)	約8.0	約173	約3.8	約8.5	約203	約3.9
識別コード	カンデサルタン EE/OD 8		カンデサルタン EE/OD 12			

※【効能・効果】【用法・用量】

カンデサルタンOD錠2mg/4mg/8mg/12mg「EE」の場合

効能・効果	用法・用量
高血圧症	通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4～8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。
腎実質性高血圧症	通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

※カンデサルタンOD錠2mg/4mg/8mg「EE」の場合

効能・効果	用法・用量
下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合	通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量できる。なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。

（裏面につづく）

※(効能・効果に関連する使用上の注意)

慢性心不全の場合

- (1)アンジオテンシン変換酵素阻害剤投与による前治療が行われていない患者における本剤の有効性は確認されておらず、本剤は、アンジオテンシン変換酵素阻害剤から切り替えて投与することを原則とする。
- (2)アンジオテンシン変換酵素阻害剤の効果が不十分な患者における本剤の有効性及び安全性、並びにアンジオテンシン変換酵素阻害剤と本剤を併用した場合の有効性及び安全性は確認されていない。

※(用法・用量に関連する使用上の注意)

※1. 慢性心不全の場合

- 投与開始時の収縮期血圧が120mmHg未満の患者、腎障害を伴う患者、利尿剤を併用している患者、心不全の重症度の高い患者には、2mg/日から投与を開始すること。2mg/日投与は、低血圧関連の副作用に対する忍容性を確認する目的であるので4週間を超えて行わないこと。
- 本剤の投与により、一過性の急激な血圧低下を起こす場合があるので、初回投与時、及び4mg/日、8mg/日への増量時には、血圧等の観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止する等の適切な処置を行うこと。
2. 本剤は口腔内で崩壊するが、口腔粘膜から吸収されることはないため、唾液又は水で飲み込むこと。  
〔適用上の注意〕の項参照)

※【使用上の注意】

※1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者  
〔重要な基本的注意〕の項参照)
- (2)高カリウム血症の患者  
〔重要な基本的注意〕の項参照)
- ※(3)腎障害のある患者  
〔過度の降圧により腎機能が悪化するおそれがあり、また、慢性心不全の臨床試験において、腎障害の合併が腎機能低下発現の要因であったことから、1日1回2mgから投与を開始するなど慎重に投与すること。〕
- (4)肝障害のある患者  
〔肝機能が悪化するおそれがある。また、活性代謝物カンデサルタンのクリアランスが低下することが推定されているため、少量から投与を開始するなど慎重に投与すること。〕
- (5)薬剤過敏症の既往歴のある患者
- (6)高齢者  
〔「高齢者への投与」の項参照〕

※2. 重要な基本的注意

高血圧症及び慢性心不全共通

- (1)両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
- (2)高カリウム血症の患者においては、高カリウム血症を増悪させるおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。  
また、腎機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。
- (3)アリスキレンフマル酸塩を併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFRが60mL/min/1.73m<sup>2</sup>未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。

- (4)降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- (5)手術前24時間は投与しないことが望ましい（アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤投与中の患者は、麻酔及び手術中にレニン-アンジオテンシン系の抑制作用による高度な血圧低下を起こす可能性がある）。

高血圧症の場合

- (1)本剤の投与により、まれに血圧が急激に低下し、ショック、失神、一過性の意識消失や腎機能の低下を起こすおそれがあるので、特に次の患者に投与する場合は、少量より開始し、増量する場合は血圧、腎機能及び患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。  
〔「重大な副作用」の項参照〕
- ア. 血液透析中の患者
- イ. 嚴重な減塩療法中の患者
- ウ. 利尿剤投与中の患者（特に最近利尿剤投与を開始した患者）
- エ. 低ナトリウム血症の患者
- オ. 腎障害のある患者
- カ. 心不全の患者

※慢性心不全の場合

- (1)通常、ジギタリス製剤、利尿剤等と併用する。なお、本剤の単独投与での有用性は確立していない。
- (2)NYHA心機能分類Ⅳの慢性心不全患者に対する本剤の有用性は確立していない（使用経験が少ない）。
- (3)大動脈弁狭窄症又は閉塞性肥大型心筋症のある患者は過度の血圧低下を来すと、症状が悪化するおそれがあるので、観察を十分に行うこと。
- (4)本剤の投与により、急激な血圧低下、腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがあるので、特に次の患者に投与する場合は、血圧、腎機能、貧血の指標（ヘモグロビン等）及び患者の状態を十分に観察しながら投与を開始し、慎重に増量すること。  
〔「重大な副作用」の項参照〕
- ア. 血液透析中の患者
- イ. 嚴重な減塩療法中の患者
- ウ. 利尿剤投与中の患者（特に最近利尿剤投与を開始した患者）
- エ. 低ナトリウム血症の患者
- オ. 腎障害のある患者
- カ. 低血圧の患者
- キ. NYHA心機能分類Ⅲ等の比較的重症度の高い慢性心不全患者

※3. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
カリウム保持性利尿剤 スピロラクトン、 トリウムテレン等 エプレレノン カリウム補給剤	血清カリウム値が上昇することがあるので注意すること。	本剤のアルドステロン分泌抑制作用によりカリウム貯留作用が増強することによる。 危険因子：特に腎機能障害のある患者
利尿剤 フロセミド、 トリクロルメチアジド等	利尿剤で治療を受けている患者に本剤を初めて投与する場合、降圧作用が増強するおそれがあるので、少量から開始するなど慎重に投与すること。	利尿剤で治療を受けている患者にはレニン活性が亢進している患者が多く、本剤が奏効しやすい。
アリスキレンフマル酸塩	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。なお、eGFRが60mL/min/1.73m <sup>2</sup> 未満の腎機能障害のある患者へのアリスキレンフマル酸塩との併用については、治療上やむを得ないと判断される場合を除き避けること。	併用によりレニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アンジオテンシン変換酵素阻害剤	腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。	併用によりレニン-アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
リチウム	リチウム中毒が報告されているので、リチウムと併用する場合には、血中のリチウム濃度に注意すること。	腎尿細管におけるリチウムの再吸収が促進される。
※ 次の薬剤により併用治療されている場合 (1)アンジオテンシン変換酵素阻害剤及びβ遮断剤 (2)ループ利尿剤及びカリウム保持性利尿剤	慢性心不全の臨床試験では、左記の併用に加え更に本剤を併用すると、立ちくらみ、ふらつき及び低血圧の発現頻度が高く、かつ程度が高いので、血圧を十分に観察すること。	「重要な基本的注意」の項の「慢性心不全の場合」の(4)参照
非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)・COX-2選択的阻害剤 インドメタシン等	降圧作用が减弱することがある。  腎障害のある患者では、さらに腎機能が悪化するおそれがある。	非ステロイド性消炎鎮痛剤・COX-2選択的阻害剤は血管拡張作用を有するプロスタグランジンの合成を阻害することから、降圧作用を减弱させる可能性があると考えられている。

#### ※4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

##### (1)重大な副作用（頻度不明）

- 血管浮腫** 顔面、口唇、舌、咽・喉頭等の腫脹を症状とする血管浮腫があらわれることがあるので観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- ショック、失神、意識消失** ショック、血圧低下に伴う失神、意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、冷感、嘔吐、意識消失等があらわれた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。特に血液透析中、嚴重な減塩療法中、利尿剤投与中あるいは心不全の患者では少量から投与を開始し、増量する場合は患者の状態を十分に観察しながら徐々に行うこと。
- 急性腎不全** 急性腎不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 高カリウム血症** 重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
- 肝機能障害、黄疸** AST (GOT)、ALT (GPT)、γ-GTPの上昇等の肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 無顆粒球症** 無顆粒球症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 横紋筋融解症** 筋肉痛、脱力感、CK (CPK) 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 間質性肺炎** 発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等を伴う間質性肺炎があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 低血糖** 低血糖があらわれることがある（糖尿病治

療中の患者であらわれやすい) ので、観察を十分に行い、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

##### (2)その他の副作用 高血圧症の場合

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、湿疹、蕁麻疹、痒疹、光線過敏症
循環器	めまい <sup>注2)</sup> 、ふらつき <sup>注2)</sup> 、立ちくらみ <sup>注2)</sup> 、動悸、ほてり、期外収縮、心房細動
精神神経系	頭痛、頭重感、不眠、眠気、舌のしびれ感、四肢のしびれ感
消化器	悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、心窩部痛、下痢、口内炎、味覚異常
肝臓	AST (GOT)、ALT (GPT)、Al-P、LDH、γ-GTPの上昇
血液	貧血、白血球減少、白血球増多、好酸球増多、血小板減少
腎臓	BUN、クレアチニンの上昇、蛋白尿
その他	倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK (CPK) 上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少、低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛

注1) このような場合には投与を中止すること。

注2) このような場合には減量、休薬するなど適切な処置を行うこと。

##### ※慢性心不全の場合

慢性心不全例では高血圧例に比べ立ちくらみ、ふらつき、低血圧、腎機能異常及び貧血等があらわれやすく、血圧、腎機能及び貧血の指標（ヘモグロビン等）に留意し、必要に応じ本剤あるいは併用薬を減量、休薬するなど適切な処置を行うこと。なお、高血圧症の場合の副作用にも注意が必要である。

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、痒疹
循環器	立ちくらみ、低血圧、ふらつき、めまい、徐脈、動悸、期外収縮、ほてり
精神神経系	頭痛、眠気、不眠、頭重感、しびれ感
消化器	悪心、心窩部痛、便秘、胃潰瘍、口渇、味覚異常、嘔吐、食欲不振、胃部不快感
肝臓	γ-GTP上昇、ALT (GPT)、AST (GOT)、LDH、Al-Pの上昇
血液	貧血、白血球減少、好酸球増多、白血球増多、血小板減少
腎臓	BUN、クレアチニンの上昇、蛋白尿
その他	血中カリウム上昇、血中尿酸上昇、血中CK (CPK) 上昇、倦怠感、脱力感、咳、浮腫、視覚異常、総コレステロール上昇、低ナトリウム血症、血清総タンパク減少

注1) このような場合には投与を中止すること。

##### 5. 高齢者への投与

高齢者では患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。〔一般に過度の降圧は好ましくないとされている（脳梗塞等が起こるおそれがある）。〕

##### 6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。また、投与中に妊娠が判明した場合には、直ちに投与を中止すること。

〔妊娠中期及び末期に本剤を含むアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤やアンジオテンシン変換酵素阻害剤を投与された高血圧症の患者で羊水過少症、胎児・新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び羊水過少症によると推測される四肢の拘縮、頭蓋顔面の変形、肺の低形成等があらわれたとの報告がある。〕

(2)授乳中の婦人に投与することを避け、やむを得ず投与する場合には授乳を中止させること。

〔ラットの周産期及び授乳期に本剤を強制経口投与すると、10mg/kg/日以上群で出生児に水腎症の発生増加が認められている。なお、ラットの妊娠末期

のみ、あるいは授乳期のみに本剤を投与した場合、いずれも300mg/kg/日で出生児に水腎症の増加が認められている。]

## 7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

## 8. 適用上の注意

### (1) 薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

### (2) 服用時

1) 本剤は舌の上のせ唾液で湿潤させ舌で軽くつぶし、崩壊後唾液のみで服用可能である。また、水で服用することもできる。

2) 本剤は寝たままの状態では、水なしで服用させないこと。

## 【薬物動態】

### 生物学的同等性試験

#### (1) カンデサルタンOD錠 2mg「EE」

カンデサルタンOD錠2mg「EE」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成24年2月29日付薬食審査発0229第10号)に基づき、カンデサルタンOD錠8mg「EE」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた。(①)

#### (2) カンデサルタンOD錠 4mg「EE」

カンデサルタンOD錠4mg「EE」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」(平成24年2月29日付薬食審査発0229第10号)に基づき、カンデサルタンOD錠8mg「EE」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた。(①)

#### (3) カンデサルタンOD錠 8mg「EE」

カンデサルタンOD錠8mg「EE」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(カンデサルタン シレキセチルとして8mg)健康成人男性に水あり及び水なし<sup>\*</sup>で絶食下单回経口投与して血漿中カンデサルタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.8)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。(①)


※水なしの服用はカンデサルタンOD錠8mg「EE」のみで、標準製剤(普通錠)は水で服用

血漿中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

#### 1) 水あり投与(カンデサルタンOD錠8mg「EE」、標準製剤共に水で服用)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-48hr</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
カンデサルタンOD錠8mg「EE」	980.6 ± 279.3	80.2 ± 22.8	5.4 ± 1.3	9.9 ± 2.6
標準製剤	967.9 ± 265.3	77.9 ± 25.3	4.8 ± 1.5	11.1 ± 4.0

(Mean ± S.D., n=19)




1錠投与時の平均血漿中薬物濃度推移(水あり)

#### 2) 水なし投与(カンデサルタンOD錠8mg「EE」は水なしで服用、標準製剤は水で服用)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-48hr</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
カンデサルタンOD錠8mg「EE」	1055.0 ± 267.0	82.3 ± 23.4	5.5 ± 1.4	9.3 ± 2.0
標準製剤	1046.7 ± 226.7	76.0 ± 20.3	5.0 ± 1.2	11.3 ± 4.9

(Mean ± S.D., n=20)



1錠投与時の平均血漿中薬物濃度推移(水なし)

#### (4) カンデサルタンOD錠12mg「EE」

カンデサルタンOD錠12mg「EE」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(カンデサルタン シレキセチルとして12mg)健康成人男性に水あり及び水なし<sup>\*</sup>で絶食下单回経口投与して血漿中カンデサルタン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、C<sub>max</sub>)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.8)~log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。(①)


※水なしの服用はカンデサルタンOD錠12mg「EE」のみで、標準製剤(普通錠)は水で服用

血漿中濃度並びにAUC、C<sub>max</sub>等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

#### 1) 水あり投与(カンデサルタンOD錠12mg「EE」、標準製剤共に水で服用)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-48hr</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
カンデサルタンOD錠12mg「EE」	1615.7 ± 304.2	136.0 ± 33.8	4.5 ± 1.8	10.1 ± 3.3
標準製剤	1631.1 ± 360.5	128.0 ± 28.0	4.6 ± 1.1	9.2 ± 2.3

(Mean ± S.D., n=20)




1錠投与時の平均血漿中薬物濃度推移(水あり)

(裏面につづく)

2) 水なし投与 (カンデサルタンOD錠12mg「EE」は水なしで服用、標準製剤は水で服用)

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0-48hr</sub> (ng・hr/mL)	C <sub>max</sub> (ng/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
カンデサルタンOD錠12mg「EE」	1657.2 ± 510.8	131.0 ± 55.1	5.2 ± 1.8	9.8 ± 3.0
標準製剤	1610.0 ± 449.7	124.3 ± 43.9	5.1 ± 1.7	12.3 ± 8.7

(Mean ± S.D., n=18)




1錠投与時の平均血漿中薬物濃度推移 (水なし)

### 【薬効薬理】

カンデサルタン シレキセチルはプロドラッグであり、経口投与後体内で活性代謝物カンデサルタンとなり作用を発現する。カンデサルタンは、アンジオテンシンⅡ受容体のうちAT<sub>1</sub>受容体と選択的に結合し、アンジオテンシンⅡの生理作用を阻害することによって降圧作用を現す。すなわち、血管平滑筋のAT<sub>1</sub>受容体でアンジオテンシンⅡと拮抗してその血管収縮作用を抑制するが、同受容体を介した副腎でのアルドステロン遊離作用に対する抑制も降圧作用に関与すると考えられている。(2)

### 【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：カンデサルタン シレキセチル (Candesartan Cilexetil)  
 化学名：(1*R*S)-1-(Cyclohexyloxy)carbonyloxy ethyl 2-ethoxy-1-[[2'-(1*H*-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1*H*-benzo[*d*]imidazole-7-carboxylate  
 分子式：C<sub>33</sub>H<sub>34</sub>N<sub>6</sub>O<sub>6</sub>  
 分子量：610.66  
 構造式：



#### 物理化学的性状：

カンデサルタン シレキセチルは白色の結晶又は結晶性の粉末である。  
 本品は酢酸 (100) にやや溶けやすく、メタノールにやや溶けにくく、エタノール (99.5) に溶けにくく、水にほとんど溶けない。  
 本品のメタノール溶液 (1 → 100) は旋光性を示さない。  
 本品は結晶多形が認められる。

### ※※【取扱い上の注意】

#### ※※安定性試験

長期保存試験 (25℃、相対湿度60%、36ヵ月) の結果、カンデサルタンOD錠 2mg「EE」、カンデサルタンOD錠 4mg「EE」、カンデサルタンOD錠 8mg「EE」及びカンデサルタンOD錠12mg「EE」(最終包装) は、通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。(3)

### 【包装】

カンデサルタンOD錠 2mg「EE」……………100錠 (PTP)  
 カンデサルタンOD錠 4mg「EE」……………500錠 (バラ)  
 100錠 (PTP)・140錠 (PTP)・500錠 (PTP)  
 カンデサルタンOD錠 8mg「EE」……………500錠 (バラ)  
 100錠 (PTP)・140錠 (PTP)・500錠 (PTP)  
 カンデサルタンOD錠12mg「EE」……………100錠 (PTP)

### 【主要文献】

- ① 生物学的同等性に関する資料 (エルメッド エーザイ株式会社 社内資料)
- ② 第十六改正日本薬局方解説書 (廣川書店) C-1199 (2011)
- ③ 安定性に関する資料 (エルメッド エーザイ株式会社 社内資料)

### 【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

エルメッド エーザイ株式会社 FAX 03-3980-6634  
 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5

### 【商品情報お問い合わせ先】

エーザイ hhc ホットライン ☎0120-223-698

製造販売元  エルメッド エーザイ株式会社  
 東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  エーザイ株式会社  
 東京都文京区小石川4-6-10

A16729-2

(CAN(T)103E)

