

※2017年4月改訂（第5版）
 ※2016年10月改訂（第4版）

処方箋医薬品^注

日本標準商品分類番号

872189

HMG-CoA還元酵素阻害剤

日本薬局方 ピタバスタチンカルシウム錠

ピタバスタチンCa錠1mg「EE」

ピタバスタチンCa錠2mg「EE」

ピタバスタチンCa錠4mg「EE」

Pitavastatin Ca tab. 1mg / 2mg / 4mg「EE」

〔貯 法〕 遮光、室温保存

〔使用期限〕 外箱又はラベルに表示の使用期限内に使用すること。

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

	1 mg	2 mg	4 mg
承認番号	22500AMX01626000	22500AMX01627000	22500AMX01628000
薬価収載	2013年12月	2013年12月	2013年12月
販売開始	2013年12月	2013年12月	2013年12月


【禁 忌】（次の患者には投与しないこと）

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 重篤な肝障害又は胆道閉塞のある患者
〔これらの患者では本剤の血漿中濃度が上昇し、副作用の発現頻度が増加するおそれがある。また、肝障害を悪化させるおそれがある。〕
3. シクロスポリンを投与中の患者
〔本剤の血漿中濃度が上昇し、副作用の発現頻度が増加するおそれがある。また、横紋筋融解症等の重篤な副作用が発現するおそれがある。〔相互作用〕の項参照〕
4. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳婦
〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

【原則禁忌】（次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること）

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に本剤とフィブラート系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合に限ること。
 〔横紋筋融解症があらわれやすい。〔相互作用〕の項参照〕

【組成・性状】

販売名	ピタバスタチンCa錠 1mg「EE」	ピタバスタチンCa錠 2mg「EE」	ピタバスタチンCa錠 4mg「EE」
有効成分 (1錠中)	ピタバスタチンカルシウム水和物 1.1mg (ピタバスタチンカルシウムとして1.0mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物 2.2mg (ピタバスタチンカルシウムとして2.0mg)	ピタバスタチンカルシウム水和物 4.4mg (ピタバスタチンカルシウムとして4.0mg)
添加物	カルナウバロウ、クエン酸トリエチル、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、三酸化鉄、ステアリン酸マグネシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、ヒプロメロース、その他1成分		
性状・ 剤形	ごくうすい赤色のフィルムコーティング錠	ごくうすい赤色の割線入りのフィルムコーティング錠	ごくうすい赤色の割線入りのフィルムコーティング錠
外形	表 裏 側面	表 裏 側面	表 裏 側面
			
	直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm) 6.1 84 2.8	直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm) 7.1 125 2.9	直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm) 8.6 248 4.0
識別 コード	ピタバスタチン 1EE	ピタバスタチン 2EE	ピタバスタチン 4EE

【効能・効果】

高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉

1. 適用の前に十分な検査を実施し、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。
2. 家族性高コレステロール血症のうちホモ接合体については使用経験がないので、治療上やむを得ないと判断される場合のみ、LDL-アフェレーシス等の非薬物療法の補助として本剤の適用を考慮すること。

【用法・用量】

通常、成人にはピタバスタチンカルシウムとして1～2mgを1日1回経口投与する。
 なお、年齢、症状により適宜増減し、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合には増量できるが、最大投与量は1日4mgまでとする。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

1. 肝障害のある患者に投与する場合には、開始投与量を1日1mgとし、最大投与量は1日2mgまでとする。
 〔「慎重投与」の項参照〕
2. 本剤は投与量（全身曝露量）の増加に伴い、横紋筋融解症関連有害事象が発現するので、4mgに増量する場合には、CK（CPK）上昇、ミオグロビン尿、筋肉痛及び脱力感等の横紋筋融解症前駆症状に注意すること。
 〔海外臨床試験において8mg以上の投与は横紋筋融解症及び関連有害事象の発現により中止されている。〕

※※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - (1) 肝障害又はその既往歴のある患者、アルコール中毒者
 〔本剤は主に肝臓に多く分布して作用するので肝障害を悪化させるおそれがある。また、アルコール中毒者は、横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。〕
 - (2) 腎障害又はその既往歴のある患者
 〔横紋筋融解症の報告例の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解症に伴って急激な腎機能の悪化が認められている。〕
 - (3) フィブラート系薬剤（ベザフィブラート等）、ニコチン酸を投与中の患者
 〔横紋筋融解症があらわれやすい。〔相互作用〕の項参照〕
 - (4) 甲状腺機能低下症の患者、遺伝性の筋疾患（筋ジスト

（裏面につづく）

ロフィー等)又はその家族歴のある患者、薬剤性の筋障害の既往歴のある患者

〔横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。〕

(5)高齢者〔「高齢者への投与」の項参照〕

※※※2.重要な基本的注意

本剤の適用にあたっては、次の点に十分に留意すること。

(1)あらかじめ高コレステロール血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や、高血圧・喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減も十分考慮すること。

(2)肝機能検査を投与開始時より12週までの間に1回以上、それ以降は定期的(半年に1回等)に行うこと。

(3)投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。

※※※4(1)近位筋脱力、CK(CPK)高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元酵素(HMGCR)抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。

〔「重大な副作用」の項参照〕

3.相互作用

本剤は肝チトクロームP450(CYP)によりほとんど代謝されない(CYP2C9でわずかに代謝される)。

(1)併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
シクロスポリン サンディミュン®、 ネオオラル®	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症等の重篤な有害事象が発現しやすい。	シクロスポリンにより本剤の血漿中濃度が上昇(C _{max} 6.6倍、AUC4.6倍)する。

(2)原則併用禁忌(原則として併用しないこと)

腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者では原則として併用しないこととする。治療上やむを得ないと判断される場合にのみ慎重に併用すること。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フィブラート系薬剤 ベザフィブラート等	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。	危険因子:腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる場合

(3)併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
フィブラート系薬剤 ベザフィブラート等	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。	腎機能障害の有無にかかわらず、両剤とも横紋筋融解症が報告されている。
ニコチン酸		危険因子:腎障害がある場合
コレステラミン	本剤の血中濃度が低下する可能性があるため、コレステラミンの投与後十分な間隔をあけて本剤を投与することが望ましい。	同時投与により本剤の吸収が低下する可能性がある。
エリスロマイシン	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれるおそれがある。自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。	左記薬剤により本剤の肝臓への取り込みが阻害されるためと考えられる。
リファンピシン	併用によりピタバスタチン製剤のC _{max} が2.0倍、AUCが1.3倍に上昇したとの報告がある。	

※※※4.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)重大な副作用(頻度不明)

1)横紋筋融解症 筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、これに伴って急性腎不全等の重篤な腎障害があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

2)ミオパチー ミオパチーがあらわれることがあるので、広範な筋肉痛、筋肉圧痛や著明なCK(CPK)の上昇があらわれた場合には投与を中止すること。

※※※3)免疫介在性壊死性ミオパチー 免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

4)肝機能障害、黄疸 AST(GOT)、ALT(GPT)の著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査等の観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

5)血小板減少 血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

6)間質性肺炎 間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	紅斑、発疹、痒疹、蕁麻疹
消化器	嘔気・悪心、胃不快感、口渇、消化不良、腹痛、腹部膨満感、便秘、口内炎、嘔吐、食欲不振、舌炎、下痢
肝臓 ^{注2)}	AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、LDH上昇、ビリルビン上昇、コリンエステラーゼ上昇、Al-P上昇
腎臓	頻尿、BUN上昇、血清クレアチニン上昇
筋肉 ^{注3)}	CK(CPK)上昇、筋肉痛、脱力感、筋痙攣、ミオグロビン上昇
精神神経系	頭痛・頭重感、しびれ、めまい、こわばり感、眠気、不眠
血液	貧血、血小板減少、顆粒球減少、白血球減少、好酸球増多、白血球増多、グロブリン上昇、クームス試験の陽性化
内分泌	テストステロン低下、アルドステロン低下、アルドステロン上昇、ACTH上昇、コルチゾール上昇
その他	脱毛、倦怠感、抗核抗体の陽性化、動悸、疲労感、皮膚疼痛、ほてり、関節痛、浮腫、霧視、目のちらつき、耳閉感、尿潜血、尿酸値上昇、血清K上昇、血清P上昇、味覚異常、着色尿

注1)このような場合には投与を中止すること。

注2)観察を十分に行い、異常が認められた場合は投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

注3)横紋筋融解症の前駆症状の可能性があるので、観察を十分に行い、必要に応じ投与を中止すること。

5.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているため、副作用が発現した場合には減量するなど注意すること。

〔横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある。〕

6.妊婦、産婦、授乳婦等への投与

(1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。

〔妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。動物実験(ラット)での周産期及び授乳期投与試験(1mg/kg以上)において分娩前又は分娩後の一時期に母動物の死亡が認められている。また、ウサギでの器官形成期投与試験(0.3mg/kg以上)において母動物の死亡が認められている。ラットに他のHMG-CoA還元酵素阻害剤を大量投与した場合に胎児の骨

格奇形が報告されている。更にヒトでは、他のHMG-CoA還元酵素阻害剤で、妊娠3ヵ月までの間に服用したとき、胎児に先天性奇形があらわれたとの報告がある。]

(2)授乳中の婦人には投与しないこと。

[動物実験(ラット)で乳汁中への移行が報告されている。]

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない(使用経験がない)。

8. 適用上の注意

薬剤交付時

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。)

※9. その他の注意

イヌの経口投与試験(3mg/kg/日以上を3ヵ月間、1mg/kg/日以上を12ヵ月間)で白内障の発現が認められている。なお、他の動物(ラット、サル)においては認められていない。

【薬物動態】

1. 生物学的同等性試験

(1)ピタバスタチンCa錠1mg「EE」

ピタバスタチンCa錠1mg「EE」は、「含量が異なる経口固形剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ピタバスタチンCa錠2mg「EE」を標準剤としたとき、溶出挙動が同等と判定され、生物学的に同等とみなされた。(1)


(2)ピタバスタチンCa錠2mg「EE」

ピタバスタチンCa錠2mg「EE」と標準剤を、クロスオーバー法によりそれぞれピタバスタチンカルシウムとして2mg健康成人男性に絶食下单回経口投与して血漿中のピタバスタチン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、 C_{max})について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。(1)

血漿中濃度並びにAUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-36hr} (ng・hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
ピタバスタチンCa錠 2mg「EE」	110.03 ± 44.57	59.94 ± 27.13	0.60 ± 0.24	10.39 ± 1.51
標準剤	108.33 ± 45.46	58.84 ± 33.04	0.68 ± 0.22	10.77 ± 1.73

(Mean ± S.D., n=20)



平均血漿中薬物濃度推移


(3)ピタバスタチンCa錠4mg「EE」

ピタバスタチンCa錠4mg「EE」と標準剤を、クロスオーバー法によりそれぞれピタバスタチンカルシウムとして4mg健康成人男性に絶食下单回経口投与して血漿中のピタバスタチン濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、 C_{max})について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。(1)

血漿中濃度並びにAUC、 C_{max} 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC _{0-36hr} (ng・hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
ピタバスタチンCa錠 4mg「EE」	166.90 ± 50.89	82.49 ± 34.82	0.93 ± 0.78	10.08 ± 1.55
標準剤	161.88 ± 44.89	77.97 ± 30.32	0.98 ± 0.75	10.41 ± 1.54

(Mean ± S.D., n=20)



平均血漿中薬物濃度推移

2. 溶出挙動

ピタバスタチンCa錠1mg「EE」、ピタバスタチンCa錠2mg「EE」及びピタバスタチンCa錠4mg「EE」は、日本薬局方医薬品各条に定められたピタバスタチンカルシウム錠の溶出規格に適合していることが確認されている。(2)

【薬効薬理】

ピタバスタチンカルシウム水和物は、コレステロール生合成の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素を選択的に阻害することによってコレステロールの生合成を抑制する。(3)

【有効成分に関する理化学的知見】


一般名：ピタバスタチンカルシウム水和物
(Pitavastatin Calcium Hydrate)

化学名：Monocalcium bis [(3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate] pentahydrate

分子式：C₃₀H₄₆CaF₂N₂O₈・5H₂O

分子量：971.06

構造式：



物理化学的性状：

ピタバスタチンカルシウム水和物は白色～微黄色の粉末である。本品はメタノールに溶けにくく、水又はエタノール(99.5)に極めて溶けにくい。本品は希塩酸に溶ける。本品は結晶多形が認められる。

【取扱い上の注意】

加速試験

加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヵ月)の結果、ピタバスタチンCa錠1mg「EE」、ピタバスタチンCa錠2mg「EE」及びピタバスタチンCa錠4mg「EE」(最終包装)は、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。(4)

(裏面にづく)

【包 装】

ピタバスタチンCa錠 1 mg「EE」……………500錠(バラ)
100錠(PTP)・140錠(PTP)・500錠(PTP)
ピタバスタチンCa錠 2 mg「EE」……………500錠(バラ)
100錠(PTP)・140錠(PTP)・500錠(PTP)
ピタバスタチンCa錠 4 mg「EE」……………100錠(PTP)

※【主要文献】

- ① 生物学的同等性に関する資料
(エルメッド エーザイ株式会社 社内資料)
- ② 溶出性に関する資料 (エルメッド エーザイ株式会社 社内資料)
- ※③ 第十七改正日本薬局方解説書(廣川書店) C-4099 (2016)
- ④ 安定性に関する資料 (エルメッド エーザイ株式会社 社内資料)


【文献請求先】


主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

エルメッド エーザイ株式会社 FAX 03-3980-6634
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5

【商品情報お問い合わせ先】

エーザイhhcホットライン
フリーダイヤル 0120-223-698

製造販売元  エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10