

ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「EE」・80mg/4mL「EE」のご使用にあたって

本剤は、ワンタキソテール®点滴静注20mg/1mL・80mg/4mL (サノフィ株式会社) 及び、タキソテール®点滴静注用20mg・80mg (サノフィ株式会社)と以下の点に関し共通点・相違点がございます。

| | ドセタキセル点滴静注「EE」 | | ワンタキソテール®点滴静注 | | タキソテール®点滴静注用 | |
|----------|--|----------|--|----------|--|------|
| 規格 | 20mg/1mL | 80mg/4mL | 20mg/1mL | 80mg/4mL | 20mg | 80mg |
| 調製方法 | プレミックス*不要 | | プレミックス*不要 | | ① 添付溶解液にて溶解 ② 生理食塩液または、5%ブドウ糖液を用いて溶解 | |
| 製剤写真 |  | |  | |  | |
| ドセタキセル濃度 | 20mg/mL ドセタキセルの濃度が、ワンタキソテール点滴静注と同じで、タキソテール点滴静注用の2倍 | | 20mg/mL ドセタキセルの濃度がタキソテール点滴静注用の2倍 | | 10mg/mL (添付溶解液で溶解後のプレミックス液) | |

*「プレミックス」とは、本剤を輸液に混和する前に、エタノール溶液または調製用輸液で溶解する作業です。

本剤はエタノールを含有していないため、粘度が高くなっております。取り扱いには十分にご注意ください。