

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2007年11月

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること  
経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤

# 硝酸イソソルビドテープ「EMEC」

<硝酸イソソルビド貼付剤>

製造販売元



救急薬品工業株式会社  
富山県射水市戸破32-7

販売元



エルメッド エーザイ株式会社  
東京都豊島区東池袋3-23-5

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.165に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

### 【改訂箇所及び改訂理由（項目別）】

#### 1. 禁忌

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前
<b>【禁忌】</b> 6. ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、 <u>タダラフィル</u> ）を投与中の患者	<b>【禁忌】</b> 6. ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する勃起不全治療剤（クエン酸シルデナフィル、塩酸バルデナフィル水和物）を投与中の患者

#### 改訂理由

自主改訂により、「禁忌」の項を改訂いたしました。

#### 2. 重要な基本的注意

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前
<b>2.重要な基本的注意</b> (7) 本剤とホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する薬剤（シルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、 <u>タダラフィル</u> ）との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を低下させることがあるので、本剤投与前にこれらの薬剤を服用していないことを十分確認すること。また、本剤投与中及び投与後においてこれらの薬剤を服用しないよう十分注意すること。	<b>2.重要な基本的注意</b> (7) 本剤とホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する勃起不全治療剤（クエン酸シルデナフィル、塩酸バルデナフィル水和物）との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を低下させることがあるので、本剤投与前にこれらの薬剤を服用していないことを十分確認すること。また、本剤投与中及び投与後においてこれらの薬剤を服用しないよう十分注意すること。

#### 改訂理由

自主改訂により、「重要な基本的注意」の項を改訂いたしました。

### 3. 相互作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました。

改訂後			改訂前		
3. 相互作用			3. 相互作用		
(1) 併用禁忌 (併用しないこと)			(1) 併用禁忌 (併用しないこと)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する <u>薬剤</u> シルденаフィルクエン酸塩(バイアグラ®)、バルデナフィル塩酸塩水和物(レビトラ®)、 <u>タダラフィル</u> (シアリス®)	併用により、降圧作用を増強することがある。	本剤は cGMP の産生を促進し、一方、ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する <u>薬剤</u> は cGMP の分解を抑制することから、両剤の併用により cGMP の増大を介する本剤の降圧作用が増強する。	ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する <u>勃起不全治療剤</u> クエン酸シルденаフィル(バイアグラ錠)、塩酸バルデナフィル水和物(レビトラ錠)	併用により、降圧作用を増強することがある。	本剤は cGMP の産生を促進し、一方、ホスホジエステラーゼ 5 阻害作用を有する <u>勃起不全治療剤</u> は cGMP の分解を抑制することから、両剤の併用により cGMP の増大を介する本剤の降圧作用が増強する。

#### 改訂理由

自主改訂により、「併用禁忌」の項を改訂いたしました。