

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2010年1月

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること  
尿失禁・頻尿治療剤

塩酸プロピペリン錠10mg「SKK」

塩酸プロピペリン錠20mg「SKK」

<プロピペリン塩酸塩錠>

製造販売元



株式会社 三和化学研究所  
名古屋市東区東外堀町35番地 〒461-8631

販売元



エルメッド エーザイ株式会社  
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.186に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、エルメッド エーザイの医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

### [改訂箇所及び改訂理由（項目別）]

#### 1. 禁忌

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前
<b>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</b> 3. 尿閉を有する患者 〔抗コリン作用により排尿時の膀胱収縮が抑制され、 <u>症状が悪化するおそれがある。</u> 〕 4. 閉塞隅角緑内障の患者 〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、 <u>症状が悪化するおそれがある。</u> 〕	<b>【禁忌】（次の患者には投与しないこと）</b> 3. 下部尿路が閉塞している患者 〔排尿筋が弛緩し、 <u>症状が悪化するおそれがある。</u> 〕 4. 緑内障の患者 〔抗コリン作用により眼圧が上昇し、 <u>症状が悪化するおそれがある。</u> 〕

#### 2. 慎重投与

<改訂部分抜粋>

下線部分を追加いたしました。

改訂後
1. 慎重投与 (2) 緑内障の患者 〔閉塞隅角緑内障の患者は禁忌である。閉塞隅角緑内障以外でも抗コリン作用により眼圧が上昇し、 <u>症状が悪化するおそれがある。</u> 〕

#### 3. その他の副作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前												
4. 副作用 (2) その他の副作用 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>循環器</td><td>徐脈、期外収縮、胸部不快感、<u>動悸、<u>血圧上昇</u></u></td></tr><tr><td>眼</td><td>調節障害、<u>眼球乾燥</u></td></tr></tbody></table>		頻度不明	循環器	徐脈、期外収縮、胸部不快感、 <u>動悸、<u>血圧上昇</u></u>	眼	調節障害、 <u>眼球乾燥</u>	4. 副作用 (2) その他の副作用 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>循環器</td><td>徐脈、期外収縮、胸部不快感、<u>動悸</u></td></tr><tr><td>眼</td><td>調節障害</td></tr></tbody></table>		頻度不明	循環器	徐脈、期外収縮、胸部不快感、 <u>動悸</u>	眼	調節障害
	頻度不明												
循環器	徐脈、期外収縮、胸部不快感、 <u>動悸、<u>血圧上昇</u></u>												
眼	調節障害、 <u>眼球乾燥</u>												
	頻度不明												
循環器	徐脈、期外収縮、胸部不快感、 <u>動悸</u>												
眼	調節障害												

改訂理由

自主改訂により、「禁忌」、「慎重投与」、「その他の副作用」の項を改訂いたしました。