

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2010年4月


処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること  
HMG-CoA 還元酵素阻害剤  
－高脂血症治療剤－

**リダック<sup>®</sup> M錠5**  
**リダック<sup>®</sup> M錠10**


〈プラバスタチンナトリウム錠〉

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること  
HMG-CoA 還元酵素阻害剤  
－高脂血症治療剤－

**リポラ<sup>®</sup> M錠5**  
〈シンバスタチン錠〉

製造販売元 

サンノーバ株式会社  
群馬県太田市世良田町3038-2

販売元 

エルメッド エーザイ株式会社  
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携 

エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
今回の改訂は、国内で発売されている全スタチン系薬剤が対象となります。なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.188に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

### 〔改訂箇所及び改訂理由（項目別）〕

#### 1. 副作用（リダック M錠5/M錠10、リポラ M錠5 共通）

＜改訂部分抜粋＞

下線部分を追加いたしました。

リダック M錠5／リダック M錠10	リポラ M錠5
改訂後	
4. 副作用 (1) 重大な副作用 1) ～ 6)：変更無し 7) <u>間質性肺炎</u> <u>間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。</u>	4. 副作用 (1) 重大な副作用 1) ～ 5)：変更無し 6) <u>間質性肺炎</u> <u>間質性肺炎があらわれることがあるので、長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。</u>

#### 改訂理由

平成22年3月23日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発0323第1号に基づき、「重大な副作用」の項を追加いたしました。