

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2010年4月

緩下剤

### ピコスルファートナトリウムDS1%「EMEC」

＜ピコスルファートナトリウム水和物ドライシロップ＞

製造販売元



サンノーバ株式会社

群馬県太田市世良田町3038-2

販 売 元



エルメッド エーザイ株式会社

東京都豊島区東池袋3-23-5

販 售 提 携



エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。  
なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.189に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

#### [改訂箇所及び改訂理由（項目別）]

##### 1. 副作用

＜改訂部分抜粋＞

下線部分を改訂いたしました。

| 改訂後  |   | 改訂前         |  |   |      |     |                             |
|--|---|-------------|--|---|------|-----|-----------------------------|
| 3. 副作用   |   | 3. 副作用      |  |   |      |     |                             |
| (2) その他の副作用  |   | (2) その他の副作用 |  |   |      |     |                             |
| <table border="1"><tr><td>頻度不明</td></tr></table>   |   | 頻度不明        | <table border="1"><tr><td>頻度不明</td></tr></table> |   | 頻度不明 |     |                             |
| 頻度不明   |   |             |  |   |      |     |                             |
| 頻度不明   |   |             |  |   |      |     |                             |
| <table border="1"><tr><td>消化器</td><td>腹部不快感、腹痛、恶心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等</td></tr></table>              |   | 消化器         | 腹部不快感、腹痛、恶心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等                      | <table border="1"><tr><td>消化器</td><td>腹部不快感、腹痛、恶心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等</td></tr></table> |      | 消化器 | 腹部不快感、腹痛、恶心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等 |
| 消化器  | 腹部不快感、腹痛、恶心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等               |             |  |   |      |     |                             |
| 消化器  | 腹部不快感、腹痛、恶心、嘔吐、腹鳴、腹部膨満感、下痢等               |             |  |   |      |     |                             |
| <table border="1"><tr><td>皮 膚</td><td>蕁麻疹、発疹等</td></tr></table>                                  |   | 皮 膚         | 蕁麻疹、発疹等  | <table border="1"><tr><td>皮 膚</td><td>蕁麻疹、発疹等</td></tr></table>                     |      | 皮 膚 | 蕁麻疹、発疹等                     |
| 皮 膚  | 蕁麻疹、発疹等                                   |             |  |   |      |     |                             |
| 皮 膚  | 蕁麻疹、発疹等                                   |             |  |   |      |     |                             |
| <table border="1"><tr><td>肝 臓</td><td>AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等</td></tr></table>                   |   | 肝 臓         | AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等                           | <table border="1"><tr><td>肝 臓</td><td>AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等</td></tr></table>      |      | 肝 臓 | AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等      |
| 肝 臓  | AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等                    |             |  |   |      |     |                             |
| 肝 臓  | AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇等                    |             |  |   |      |     |                             |
| <table border="1"><tr><td>精神神経系</td><td>めまい<sup>注)</sup>、一過性の意識消失<sup>注)</sup></td></tr></table> |   | 精神神経系       | めまい <sup>注)</sup> 、一過性の意識消失 <sup>注)</sup>        |   |      |     |                             |
| 精神神経系  | めまい <sup>注)</sup> 、一過性の意識消失 <sup>注)</sup> |             |  |   |      |     |                             |
| 注) 大腸検査前処置に用いた場合、排便や腹痛による血管迷走神経反射に伴い症状があらわれることがある。   |   |             |  |   |      |     |                             |

#### 改訂理由

自主改訂により、「その他の副作用」の項を変更いたしました。