

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2011年1月

スルホニルウレア系経口血糖降下剤


グリメピリド錠1mg「EMEC」
グリメピリド錠3mg「EMEC」

<グリメピリド錠>

スルホニルウレア系経口血糖降下剤

グリメピリドOD錠1mg「EMEC」
グリメピリドOD錠3mg「EMEC」

<グリメピリド口腔内崩壊錠>

製造販売元  エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.196に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

[改訂箇所（項目別）]

1. 副作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を追加いたしました。

改訂後		改訂前	
4. 副作用		4. 副作用	
(3) その他の副作用		(3) その他の副作用	
	頻度不明		頻度不明
血液	白血球減少、貧血、血小板減少	血液	白血球減少、貧血、血小板減少
肝臓	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、Al-P 上昇、LDH 上昇、 γ -GTP 上昇	肝臓	AST (GOT) 上昇、ALT (GPT) 上昇、Al-P 上昇、LDH 上昇、 γ -GTP 上昇
腎臓	BUN上昇	腎臓	BUN上昇
消化器	嘔気、嘔吐、心窩部痛、下痢、便秘、腹部膨満感、腹痛	消化器	嘔気、嘔吐、心窩部痛、下痢、便秘、腹部膨満感、腹痛
過敏症	光線過敏症、発疹、瘙痒感等	過敏症	光線過敏症、発疹、瘙痒感等
精神神経系	めまい、頭痛	精神神経系	めまい、頭痛
その他	<u>味覚異常</u> 、血清カリウム上昇・ナトリウム低下等の電解質異常、倦怠感、CK (CPK) 上昇、浮腫、脱毛、一過性視力障害	その他	血清カリウム上昇・ナトリウム低下等の電解質異常、倦怠感、CK (CPK) 上昇、浮腫、脱毛、一過性視力障害

改訂理由

自主改訂により、「その他の副作用」の項を改訂いたしました。