

使用上の注意改訂のお知らせ

劇薬

非ステロイド性消炎・鎮痛剤

メロキシカム錠5mg「EMEC」

メロキシカム錠10mg「EMEC」

<メロキシカム錠>

2011年8月

製造販売元 **DAITO**

ダイト株式会社
富山県富山市八日町326番地

販売元 **EMEC**

エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携 **Eisai**

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。なお、DSU（医薬品安全対策情報）へは、No.202に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

[改訂箇所及び改訂理由]

1. 相互作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を追加いたしました。

改訂後			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ACE阻害薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤	(変更なし)	(変更なし)	ACE阻害薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤	(省略)	(省略)
選択的セロトニン再取り込み阻害剤	(変更なし)	(変更なし)	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	(省略)	(省略)
プロスタグランジン合成阻害剤（糖質コルチコイド、他の非ステロイド性消炎鎮痛剤、サリチル酸塩（アスピリンを含む））	(変更なし)	(変更なし)	プロスタグランジン合成阻害剤（糖質コルチコイド、他の非ステロイド性消炎鎮痛剤、サリチル酸塩（アスピリンを含む））	(省略)	(省略)
<u>抗凝固剤</u> <u>トロンビン阻害剤</u> (ダビガトランエテキシラート等) <u>クマリン系抗凝固剤</u> (ワルファリン等) <u>ヘパリン</u>	出血傾向が増強するおそれがあるので、併用が避けられない場合は、血液凝固に関する検査を行うなど、これら薬剤の効果を十分観察すること。	これら薬剤は抗凝固作用を有するためと考えられる。また、CYP2C9による代謝において、本剤とワルファリンとの薬物相互作用が起こるおそれがある。	<u>クマリン系抗凝固剤</u> (ワルファリン等) <u>ヘパリン</u>	出血傾向が増強するおそれがあるので、併用が避けられない場合は、血液凝固に関する検査を行うなど、これら薬剤の効果を十分観察すること。	これら薬剤は抗凝固作用を有するためと考えられる。また、CYP2C9による代謝において、本剤とワルファリンとの薬物相互作用が起こるおそれがある。
抗血小板剤 (チクロピジン)	(変更なし)	(変更なし)	抗血小板剤 (チクロピジン)	(省略)	(省略)
血栓溶解剤	(変更なし)	(変更なし)	血栓溶解剤	(省略)	(省略)
(以下、省略)			(以下、省略)		

改訂理由

自主改訂により、「併用注意」の項を改訂いたしました。