

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2014年1月

劇薬

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

高血圧症・狭心症治療薬

持続性 Ca 拮抗薬

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩錠

**アムロジピン錠 2.5mg「EMEC」**

**アムロジピン錠 5mg「EMEC」**

**アムロジピン錠 10mg「EMEC」**

劇薬

処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること

高血圧症・狭心症治療薬

持続性 Ca 拮抗薬

日本薬局方 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠

**アムロジピンOD錠 2.5mg「EMEC」**

**アムロジピンOD錠 5mg「EMEC」**

**アムロジピンOD錠 10mg「EMEC」**

製造販売元



エルメッド エーザイ株式会社  
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。なお、改訂内容につきましては DSU（医薬品安全対策情報）No.226 に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

### [改訂箇所（項目別）]

#### 1. 副作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を追加いたしました。

改訂後		改訂前	
<b>(2) その他の副作用</b> 次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。		<b>(2) その他の副作用</b> 次のような副作用が認められた場合には、必要に応じ、減量、投与中止等の適切な処置を行うこと。	
	頻度不明		頻度不明
	(中略：変更なし)		(中略)
循環器	徐脈、浮腫 <sup>注1)</sup> 、ほてり（熱感、顔面潮紅等）、動悸、 血圧低下、胸痛、期外収縮、洞房又は房室ブロック、 洞停止、心房細動、失神、 <u>頻脈</u>	循環器	徐脈、浮腫 <sup>注1)</sup> 、ほてり（熱感、顔面潮紅等）、動悸、 血圧低下、胸痛、期外収縮、洞房又は房室ブロック、 洞停止、心房細動、失神
	(以下略：変更なし)		(以下略)
注1) 10mgへの増量により高頻度に認められたとの報告がある。		注1) 10mgへの増量により高頻度に認められたとの報告がある。	

#### 改訂理由

同一成分薬において、国内症例集積に伴う自主改訂が行われることに基づき、「その他の副作用」の項に「頻脈」を追記いたしました。