

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。



使用上の注意改訂のお知らせ

2014年3-4月

劇薬、処方せん医薬品：注意－医師等の処方せんにより使用すること
アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤

アナストロゾール錠1mg「EE」

〈アナストロゾール錠〉

製造販売元  エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5
販売提携  エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
改訂内容につきましてはDSU（医薬品安全対策情報）No.228に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

〔改訂箇所及び改訂理由（項目別）〕

1. 副作用

＜改訂部分抜粋＞

下線部分を改訂いたしました（_____部分を追加、_____部分を削除）。

改訂後	改訂前																												
(1)重大な副作用（頻度不明） 1) 省略（変更なし） 2)アナフィラキシー、血管浮腫、蕁麻疹 アナフィラキシー、血管浮腫、蕁麻疹等の過敏症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 3)～5) 省略（変更なし）	(1)重大な副作用（頻度不明） 1) 省略 2)アナフィラキシー 様症状 、血管浮腫、蕁麻疹 アナフィラキシー、血管浮腫、蕁麻疹等の過敏症状があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 3)～5) 省略																												
(2)その他の副作用 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>省略（変更なし）</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td><u>感覚異常（錯感覚、味覚異常を含む）、傾眠、手根管症候群</u></td></tr><tr><td></td><td>省略（変更なし）</td></tr><tr><td>筋・骨格系</td><td>関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、弾発指、<u>筋肉痛</u></td></tr><tr><td></td><td>省略（変更なし）</td></tr><tr><td>その他</td><td>高コレステロール血症、高カルシウム血症</td></tr></tbody></table>		頻度不明		省略（変更なし）	精神神経系	<u>感覚異常（錯感覚、味覚異常を含む）、傾眠、手根管症候群</u>		省略（変更なし）	筋・骨格系	関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、弾発指、 <u>筋肉痛</u>		省略（変更なし）	その他	高コレステロール血症、高カルシウム血症	(2)その他の副作用 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>省略</td></tr><tr><td>精神神経系</td><td>傾眠、手根管症候群</td></tr><tr><td></td><td>省略</td></tr><tr><td>筋・骨格系</td><td>関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、弾発指</td></tr><tr><td></td><td>省略</td></tr><tr><td>その他</td><td>高コレステロール血症</td></tr></tbody></table>		頻度不明		省略	精神神経系	傾眠、手根管症候群		省略	筋・骨格系	関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、弾発指		省略	その他	高コレステロール血症
	頻度不明																												
	省略（変更なし）																												
精神神経系	<u>感覚異常（錯感覚、味覚異常を含む）、傾眠、手根管症候群</u>																												
	省略（変更なし）																												
筋・骨格系	関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、弾発指、 <u>筋肉痛</u>																												
	省略（変更なし）																												
その他	高コレステロール血症、高カルシウム血症																												
	頻度不明																												
	省略																												
精神神経系	傾眠、手根管症候群																												
	省略																												
筋・骨格系	関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、弾発指																												
	省略																												
その他	高コレステロール血症																												

改訂理由

同一成分薬において、国内症例の集積に伴う自主改訂が行われることに基づき、「その他の副作用」に「感覚異常（錯感覚、味覚異常を含む）」、「筋肉痛」、「高カルシウム血症」を追記いたしました。また、医薬品・医療機器等安全性情報 No.299（2013年2月）に基づき、「アナフィラキシー様症状」を「アナフィラキシー」の用語に記載整備いたしました。