

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2014年3-4月

経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤


ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」

ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」

〈ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤〉

製造販売元  EMEC

エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  Eisai

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。改訂内容につきましてはDSU（医薬品安全対策情報）No.228に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

[改訂箇所及び改訂理由（項目別）]

1. 妊婦、産婦、授乳婦等への使用

＜改訂部分抜粋＞

下線部分を改訂いたしました。

改訂後	改訂前
(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある <u>女性</u> には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ使用すること。 〔妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。〕	妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ使用すること。 〔妊娠中の使用に関する安全性は確立していない。〕
(2) 他の非ステロイド性消炎鎮痛剤の <u>外皮用剤を妊娠後期の女性に使用し、胎児動脈管収縮が起きたとの報告がある。</u>	

改訂理由

平成26年3月25日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発0325第1号に基づき、「**妊婦、産婦、授乳婦等への使用**」の項を改訂いたしました。