

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

使用上の注意改訂のお知らせ

2014年6-7月

処方箋医薬品：注意－医師等の処方箋により使用すること
持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤
日本薬局方 エナラプリルマレイン酸塩錠

エナラプリルM錠2.5「EMEC」

エナラプリルM錠5「EMEC」

エナラプリルM錠10「EMEC」

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

販売元



エルメッド エーザイ株式会社
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
改訂内容につきましてはDSU（医薬品安全対策情報）No.230に掲載の予定です。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等については、弊社ホームページ（<http://www.emec.co.jp>）及び医薬品医療機器情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp>）に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日9:00～17:00）までご連絡ください。

[改訂箇所及び改訂理由(項目別)]

1. 相互作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました(____部分を追加)。

改訂後			改訂前		
(2)併用注意（併用に注意すること）			(2)併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略（変更なし）			省略		
アリスキレン	省略（変更なし）	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。	アリスキレン	省略	併用によりレニン・アンジオテンシン系阻害作用が増強される可能性がある。
<u>アンジオテンシンII受容体拮抗剤</u>	<u>腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起すおそれがあるため、腎機能、血清カリウム値及び血圧を十分に観察すること。</u>				
省略（変更なし）			省略		

改訂理由

平成26年6月3日付 厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知 薬食安発0603第1号に基づき、「併用注意」の項に、アンジオテンシンII受容体拮抗剤との併用に関する注意を追記いたしました。