

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

## 使用上の注意改訂のお知らせ

2015年5月

処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること  
経皮吸収型・気管支拡張剤


# ツロブテロールテープ0.5「EMEC」

# ツロブテロールテープ1「EMEC」

# ツロブテロールテープ2「EMEC」

〈ツロブテロール貼付剤〉

製造販売元  **ニフ.ロパッチ株式会社**  
埼玉県春日部市南栄町8番地1

販売元  **エルメッド エーザイ株式会社**  
東京都豊島区東池袋3-23-5

販売提携  **エーザイ株式会社**  
東京都文京区小石川4-6-10

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。

今後の弊社製品のご使用に際しましては、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。禁忌を含む使用上の注意等につきましては、弊社ホームページ (<http://www.emec.co.jp>) 及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ (<http://www.pmda.go.jp>) に掲載されている最新の添付文書をご確認ください。

なお、製品に関するお問合せにつきましては、弊社医薬情報担当者または商品情報センター（フリーダイヤル：0120-223-698、平日 9:00～17:00）までご連絡ください。

### [改訂の概要]

副作用の項—重大な副作用	アナフィラキシー様症状をアナフィラキシーに変更 (医薬品・医療機器等安全性情報 No.299 (2013年2月) に基づく)
--------------	---

### [改訂箇所及び改訂理由(項目別)]

#### 1. 副作用

<改訂部分抜粋>

下線部分を改訂いたしました(\_\_\_\_\_部分を削除)。

改訂後	改訂前
(1)重大な副作用 (頻度不明) 1) アナフィラキシー アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 2) : 省略 (変更なし)	(1)重大な副作用 (頻度不明) 1) アナフィラキシー <u>様症状</u> アナフィラキシー <u>様症状</u> を起こすことがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等の症状が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。 2) : 省略

#### 改訂理由

医薬品・医療機器等安全性情報 No.299 (2013年2月) に基づき、「アナフィラキシー様症状」を「アナフィラキシー」の用語に記載整備いたしました。