

フェルビナクテープ[®] 70mg「EMEC」の市販後調査成績

表 1 調査結果の概要

対象疾患	変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、 上腕骨上顆炎（テニス肘等）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛
調査期間	2004年4月～2005年6月（15ヶ月間）
調査施設数	82施設
安全性評価対象症例数	486例
副作用発現例数	28例（5.76%）

表 2 副作用の内訳*

器官別大分類	有害事象名	副作用	
		件数	発現率（%）
皮膚および 皮下組織障害	皮膚炎	3	（0.62）
	接触性皮膚炎	13	（2.67）
	そう痒	3	（0.62）
	皮膚そう痒	3	（0.62）
	発赤	7	（1.44）
	皮疹	1	（0.21）
	皮膚刺激	2	（0.41）
	蕁麻疹	1	（0.21）
合 計		33	（6.79）

*安全性評価対象症例 486 例中、副作用発現症例 28 例 33 件の内訳

引用文献

袴田 芳樹 他：経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤フェルビナク P「EMEC」の使用成績調査. Progress in Medicine, 27(6).1441-1459, 2007