

市販後の副作用発現状況一覧

メニレット70%ゼリー-20g・30g

弊社では、副作用発現頻度が明確となる大規模な調査を実施しておりません。上市後に報告があった自発報告症例を集計しました。

(集計期間：2005年3月2日～2018年3月末)

発売以来、107例143件の副作用報告を収集しております。

	副作用名	報告件数	
		重篤	非重篤
免疫系障害	アナフィラキシー様ショック	1	0
代謝および栄養障害	食欲減退	0	4
精神障害	不眠症	0	5
神経系障害	意識変容状態	1	0
	浮動性めまい	0	4
	味覚異常	0	3
	舌ピリピリ感	0	1
	頭部不快感	0	3
	頭痛	0	5
	感覚鈍麻	0	1
	片頭痛	0	1
	傾眠	0	2
	入眠障害	0	1
	不眠	0	1
	振戦	0	2
眼障害	眼瞼浮腫	0	1
	眼瞼びらん	0	1
	眼痛	0	1
心臓障害	動悸	0	7
血管障害	ほてり	0	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	咽喉乾燥	0	1
	呼吸困難	0	1
	鼻の炎症	0	1
	鼻浮腫	0	1
	くしゃみ	0	8
	咽喉刺激感	0	1

	副作用名	報告件数	
		重篤	非重篤
胃腸障害	腹部不快感	0	2
	悪心	0	1
	腹痛	0	2
	上腹部痛	0	1
	異常便	0	1
	便秘	0	1
	齲歯	0	1
	歯肉浮腫	0	1
	下痢	0	5
	吐血	0	1
	悪心	0	12
	口腔浮腫	0	1
	流涎過多	0	1
	歯痛	0	1
	嘔吐	0	3
	口の感覚鈍麻	0	2
	口の錯感覚	0	2
	びらん性食道炎	0	1
	口腔粘膜びらん	0	1
	皮膚および 皮下組織障害	アレルギー性皮膚炎	1
薬疹		1	3
皮膚乾燥		0	1
紅斑		1	3
多形紅斑		0	1
発疹		0	10
紅斑性皮疹		0	1
蕁麻疹		0	1
筋骨格系および 結合組織障害	関節強直	0	1
腎および尿路障害	出血性膀胱炎	1	0
	排尿困難	0	1
	頻尿	0	1
	腎臓痛	0	1
一般・全身障害および 投与部位の状態	胸痛	0	1
	異常感	0	1
	倦怠感	0	1
	浮腫	0	2
	末梢性浮腫	0	2
	発熱	0	1
	口渇	0	2
粘膜びらん	0	1	

	副作用名	報告件数	
		重篤	非重篤
臨床検査	血中ブドウ糖増加	0	1
	血圧低下	0	1
	体重減少	0	1
	体重増加	0	1
傷害、中毒および 処置合併症	硬膜下血腫	1	0
	小計	7	136
	合計	143	

《ご注意》

- 副作用名はICH国際医薬品用語集日本版（MedDRA/J）の基本用語（PT）で示しています。
- 自発報告の集計のため母数が不明であり、頻度は算出できません。
- 一覧は、6ヵ月毎に更新予定です。
- 重篤症例については、当局への報告を行っております。