

エルメッド エーザイ(エーザイグループ)のジェネリック医薬品

処方せん医薬品：注意—医師等の処方せんにより使用すること
 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 (SSRI)

薬価基準収載

フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg/50mg/75mg「EMEC」

＜フルボキサミンマレイン酸塩錠＞

● 製品名の末尾「EMEC」は「Elmed Eisai Co.,Ltd.」の略称です。

25mgのバラ包装(500錠)も用意しました




ウィークリーの小包装
 140錠(14錠PTP×10)に加え、
 25mg錠に
**バラ包装(500錠)も
 用意しました。**

25 mg	50 mg	75 mg
100 錠(PTP)	100 錠(PTP)	100 錠(PTP)
140 錠(PTP)	140 錠(PTP)	
500 錠(PTP)	500 錠(PTP)	
700 錠(PTP)	700 錠(PTP)	
500 錠(バラ)	500 錠(バラ)	

識別コードの表示に工夫し、含量を印字したフィルムコーティング錠です

識別コードは **EE** (Elmed Eisai) と規格含量 **025, 050, 075** を印字しています。



規格含量が
目立つように
表示

会社名
を表示

フルボキサミンを大きく表示


規格ごとにPTPカラーを選定

スリットごとへ製品名を表示

見やすい文字(UDフォント)や、カラーにも配慮したデザインに仕上げました。

錠剤の構造

付着性の低いフィルムコート成分を選択し、さらにD-マンニトールをアンダーコーティングし、より安定性を高めた製剤です。



薬価の低いジェネリック医薬品です

製剤名	25 mg		50 mg		75 mg	
	診療報酬上の 先発・代表 薬剤	フルボキサミン マレイン酸塩錠 25mg「EMEC」	診療報酬上の 先発・代表 薬剤	フルボキサミン マレイン酸塩錠 50mg「EMEC」	診療報酬上の 先発・代表 薬剤	フルボキサミン マレイン酸塩錠 75mg「EMEC」
薬価	42.30円	29.60円	73.60円	51.50円	102.10円	71.20円
標準的な 用法・用量	1日 50mg(初期量)、2回分服 1日150mgまで増量					
1日薬価 (薬剤料:点数)*	253.80円 (25点)	177.60円 (18点)	220.80円 (22点)	154.50円 (15点)	204.20円 (20点)	142.40円 (14点)

※1日150mg服用の場合

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2. モノアミン酸化酵素阻害剤(選択的B型モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩)を含む)を投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕
3. チオリダジン、ピモジド、チザニジン塩酸塩、ラメルテオンを投与中の患者〔「相互作用」の項参照〕

【原則禁忌】(次の患者には投与しないことを原則とするが、特に必要とする場合には慎重に投与すること)

シサプリドを投与中の患者
 〔併用によりQT延長、心室性不整脈等が発現する可能性があるため、治療上やむを得ないと判断される場合にのみ慎重に投与すること。〔「相互作用」の項参照〕〕

● 効能・効果、用法・用量、禁忌、原則禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

処方せん医薬品^{※1}

選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)

承認番号	22200AMX00548000	22200AMX00549000	22200AMX00550000
薬価収載	2010年11月	2010年11月	2010年11月
販売開始	2010年11月	2010年11月	2010年11月

〈フルボキサミンマレイン酸塩錠〉

〔貯 法〕 室温保存

〔使用期限〕 外箱又はラベルに表示の使用期限内に使用すること。

〔注〕 注意一医師等の処方せんにより使用すること

販売名	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」
有効成分 (1錠中)	フルボキサミンマレイン酸塩 25mg	フルボキサミンマレイン酸塩 50mg	フルボキサミンマレイン酸塩 75mg
添加物	アルファー化デンブ、黄色三酸化鉄、カルナウバロウ、カルメロースカルシウム、酸化チタン、トウモロコシデンブ、D-マンニトール、ポリビニルアルコール・ポリエチレングリコール・クラフトコポリマー、無水リン酸水素カルシウム		
性状・剤形	黄色のフィルムコーティング錠		
外形	表 裏 側面	表 裏 側面	表 裏 側面
識別コード	直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm) 5.2 約50 2.3	直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm) 6.2 約97 3.0	直径・質量・厚さ (mm) (mg) (mm) 7.2 約144 3.3
	EE025	EE050	EE075

いて、他の選択的セロトニン再取り込み阻害剤が精子特性を変化させ、受精率に影響を与える可能性が報告されている。

※包装

フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	500錠(バラ) 100錠(PTP)・140錠(PTP)・500錠(PTP)・700錠(PTP)
フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	500錠(バラ) 100錠(PTP)・140錠(PTP)・500錠(PTP)・700錠(PTP)
フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	100錠(PTP)

●詳細は添付文書等をご参照ください。また、禁忌、原則禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。

※2011年5月改訂

製造販売元

販売提携

商品情報お問い合わせ先:

エルメッド エーザイ株式会社 商品情報センター ☎0120-223-698
エーザイ株式会社 お客様ホットライン ☎0120-419-497

CODE FLU(1)002D
2011年5月作成