

クロピドグレル錠「EE」適応追加承認取得のご案内

2015年10月吉日

エルメッド エーザイ株式会社

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より弊社製品につきましては、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、弊社の **クロピドグレル錠25mg/50mg/75mg「EE」** は、平成 27 年 10 月 28 日付で、適応追加に係る医薬品製造販売承認事項の一部変更承認を取得しましたので、ご案内申し上げます。これにより、本剤は下記の患者様への投与が可能となります。

- 経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患
急性冠症候群（不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞）
安定狭心症、陳旧性心筋梗塞

今後とも変わらぬご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

適応追加後の【効能・効果】、【用法・用量】は以下となります。

_____ 下線が追加された適応

【効能・効果】

- 虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制
 - 経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患
急性冠症候群（不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞）
安定狭心症、陳旧性心筋梗塞
- ※末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制の効能・効果はありません。

【用法・用量】

- 虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制の場合
通常、成人には、クロピドグレルとして **75mg** を 1 日 1 回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして **50mg** を 1 日 1 回経口投与する。
- 経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患の場合
通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして **300mg** を 1 日 1 回経口投与し、その後、維持量として 1 日 1 回 **75mg** を経口投与する。

本件およびエルメッド エーザイ製品に関するお問い合わせは、
弊社医薬情報担当者またはエーザイ hhc ホットラインへ

エーザイ hhc ホットライン

フリーダイヤル：0120-223-698

（受付時間：平日 9:00～18:00 / 土日・祝日 9:00～17:00）

<http://www.emec.co.jp>



エルメッド エーザイ株式会社

CLO(2)001
2015年10月作成