

カンデサルタン錠/OD錠「EE」適応追加承認取得のご案内

2016年4月吉日

エルメッド エーザイ株式会社

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社製品につきましては、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社のカンデサルタン錠/OD錠「EE」は、平成28年4月27日付で、適応追加に係る医薬品製造販売承認事項の一部変更承認を取得しましたので、ご案内申し上げます。これにより、本剤の効能・効果、用法・用量は下記の通りとなり、先発医薬品と同じになりました。

今後とも変わらぬご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

適応追加後の【効能・効果】、【用法・用量】は以下となります。

_____下線が追加された適応

カンデサルタン錠・OD錠 2mg/4mg/8mg/12mg「EE」の場合

効能・効果	用法・用量
高血圧症	通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4~8mgを経口投与し、必要に応じ12mgまで増量する。ただし、腎障害を伴う場合には、1日1回2mgから投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。
腎実質性高血圧症	通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして2mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量する。

カンデサルタン錠・OD錠 2mg/4mg/8mg「EE」の場合

効能・効果	用法・用量
下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合 慢性心不全（軽症~中等症）	通常、成人には1日1回カンデサルタン シレキセチルとして4mgから経口投与を開始し、必要に応じ8mgまで増量できる。 なお、原則として、アンジオテンシン変換酵素阻害剤以外による基礎治療は継続すること。

本件およびエルメッド エーザイ製品に関するお問い合わせは、
弊社医薬情報担当者またはエーザイ hhc ホットラインへ
エーザイ hhc ホットライン
フリーダイヤル：0120-223-698
(受付時間：平日 9:00~18:00 / 土日・祝日 9:00~17:00)

<http://www.emec.co.jp>



エルメッド エーザイ株式会社

CAN(2)001
2016年4月作成