

# オランザピン錠 2.5mg/5mg/10mg/20mg 「EE」

## 適応追加承認取得のご案内

2016年6月吉日

エルメッド エーザイ株式会社

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より弊社製品につきましては、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社のオランザピン錠 2.5mg/5mg/10mg/20mg 「EE」は、平成28年6月1日付で、適応追加に係る医薬品製造販売承認事項の一部変更承認を取得しましたので、ご案内申し上げます。これにより、本剤の効能・効果、用法・用量は下記の通りとなり、先発医薬品と同じになりました。

今後とも変わらぬご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

適応追加後の【効能・効果】、【用法・用量】は以下となります。

\_\_\_\_\_下線が追加された適応

| 効能・効果                 | 用法・用量   |
|-----------------------|---|
| 統合失調症                 | 通常、成人にはオランザピンとして5～10mgを1日1回経口投与により開始する。維持量として1日1回10mg経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。ただし、1日量は20mgを超えないこと。  |
| 双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善 | <u>双極性障害における躁症状の改善</u><br>通常、成人にはオランザピンとして10mgを1日1回経口投与により開始する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、 <u>1日量は20mgを超えないこと。</u><br><u>双極性障害におけるうつ症状の改善</u><br>通常、成人にはオランザピンとして5mgを1日1回経口投与により開始し、その後1日1回10mgに増量する。なお、 <u>いずれも就寝前に投与することとし、年齢、症状に応じ適宜増減するが、1日量は20mgを超えないこと。</u> |

本件およびエルメッド エーザイ製品に関するお問い合わせは、

弊社医薬情報担当者またはエーザイ hhc ホットラインへ

エーザイ hhc ホットライン

フリーダイヤル：0120-223-698

(受付時間：平日 9:00～18:00 / 土日・祝日 9:00～17:00)

<http://www.emec.co.jp>



エルメッド エーザイ株式会社

OLA(2)001  
2016年6月作成